


WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Leucoraja circularis (Couch, 1838).

VERSPREIDING

Noordoost-Atlantische Oceaan: Marokko tot Noorwegen en IJsland. Ook in westelijke Middellandse Zeeⁱⁱ.



LOKALE NAMEN

ZANDROG, Spiegelrog, Bastardrog, Vlieger, Sandy Ray (UK), Raie Circulaire (Fr), Sandroche (De), Raya Falsa Vela (Es), Razza Rotonda (It).

KENMERKEN

- 1 Slanke staart iets langer dan lichaam^{iv}.
- 2 Rugvinnen dichtbij elkaar en zonder stekel ertussen.
- 3 Rugzijde ruw^{vi}.

KLEUR

- 4–6 symmetrische, crèmekleurige vlekken op elke borstvin.
- Rugzijde lichtbruin (zandkleurig) tot rood-bruinⁱⁱ.
- Buikzijde wit^{vi}.

BIOLOGIE EN GROOTTE

- Max TL: 120 cm^{vi}.
- Eten diverse ongewervelde bodemdieren en kleine beenvissenⁱ.
- Vrouwtjes leggen eieren op zacht substraat van augustus tot november^{iv}.

GELIJKAARDIGE SOORTEN

- Leucoraja fullonica, **Kaardrog**
- Leucoraja melitensis, **Maltese Rog**
- Leucoraja naevus, **Grootoogrog**
- Raja microcellata, **Kleinoogrog**

HABITAT

- Levend op of in de bodem van 70–275 m^{iv}, waarschijnlijk ook dieper.
- Voornamelijk ~100 m^{iv} hoewel voorkeur mogelijk naar dieper verschuift (~180 m)^v.
- Voorkeur voor zachte substraten zoals zand en slibⁱⁱ.

BESCHERMINGSSTATUS

- Intensief bevestigd door de sleepnetvisserij. Kan hebben geleid tot een daling in de populaties vnl. op het continentaal plat (aan rand van voorkomen). Door trage voortplanting zijn ze extra kwetsbaar voor intensieve visserij^v. Soms gevangen nabij de kust.
- Status op de Rode Rijst:** EN - Bedreigd (2015)^{vii}. EN - Bedreigd in Europese wateren (2015)^{viii}.

COMMERCIEEL BELANG

- Momenteel geen gerichte visserij maar vaak bijvangst bij de gemengde sleepnetvisserij^v.
- Commercieel belangrijk in het zuidelijke deel van zijn voorkomingsgebied en in de Middellandse Zee^{vi}.
- Vanaf 2009 - voor deze soort geldt een vangstquotum in Europese wateren.

HANTEREN EN STEKELPOSITIE


- Voorzichtig hanteren.
- Rij van stekels op de middenlijn.
- Stekels nabij het oog en snuit.

REFERENTIES

- Agustin, L. Q.; 2009.
- Barnes, M. K. S.; 2008. Marine Biological Association.
- Clark, R. S.; 1926. Fishery Board for Scotland.
- FAO; 2005.
- Gibson, C. *et al*; 2006. IUCN SSC Shark Specialist Group.
- Whitehead, P. J. P. *et al*; 1986. UNESCO.
- McCully, S. *et al*; 2015. IUCN Red List.
- Nieto, A. *et al*; 2015. European Red List of Marine Fishes.

TANDEN

- 64–84 rijen tanden in de bovenkaak. Puntig bij volwassen mannetjes, minder puntig bij vrouwtjes en juvenielenⁱⁱⁱ.



EIKAPSEL



1 82–94 mm lang (exclusief hoorns).

2 46–53 mm breedⁱ.

Eikapsel lijkt op dat van de Grootoogrog, *Leucoraja naevus*ⁱⁱⁱ.

(Eikapsel op ware grootte.)