


## WETENSCHAPPELIJKE NAAM

*Scyliorhinus stellaris* (Linnaeus, 1758).

## VERSPREIDING

Noordoost-Atlantische Oceaan: van Zuid-Scandinavië en de Britse Eilanden tot Marokko, ook in de Middellandse Zee. Mogelijk tropisch West-Afrika<sup>1</sup>.



## LOKALE NAMEN

**KATHAAI**, Dog, Grootgevekte Hondshaai, Hondje met grote spikkels, Nursehound (UK), Grande Roussette (Fr), Alitán (Es).

## KENMERKEN

- 1 Neusflappen lopen niet door tot aan de mond.
- 2 Geen stekels op de rugzijde.
- 3 Met anaalvin<sup>1</sup>.

## KLEUR


- Rugzijde crèmebruin.
- Talrijke grote en kleine donkere stippen.
- Soms witte stippen.
- Buikzijde wit<sup>1</sup>.

## BIOLOGIE EN GROOTTE

- Bij geboorte: 16 cm. Max TL: 162 cm<sup>1</sup>.
- Eierlegend, meldingen van een broedtijd van 9–11 maanden<sup>iii</sup>.
- Eten voornamelijk inktvissen. Ook kreeftachtigen, schelpdieren en vissen zijn belangrijk<sup>1</sup>.

## TANDEN


- 44–56 tanden in de bovenkaak, inclusief 0–2 symphysetanden.
- 38–46 tanden in de onderkaak, inclusief 2–4 symphysetanden.
- Voorste tanden met een enkele opgerichte punt.
- Achter in de kaak zijn bijspitsen ontwikkeld<sup>iv</sup>.




## GELIJKAARDIGE SOORTEN




*Scyliorhinus stellaris*, Kathaaï



*Scyliorhinus canicula*, Hondshaai



*Galeus melastomus*, Spaanse Hondshaai



*Galeus murinus*, Muiskathaaï



*Galeus atlanticus*, Atlantische Zaagstaartkathaaï

## HABITAT

- Van het intergetijdengebied tot 400 m<sup>v</sup>, voornamelijk 20–63 m<sup>i</sup>.
- Voorkeur voor rotsbodems of gebieden met veel beschutting door algen<sup>i</sup>.
- Kan in grote getalen voorkomen, hoewel niet in dezelfde mate als de Hondshaai, *Scyliorhinus canicula*<sup>ii</sup>.

## BESCHERMINGSSTATUS

- Hoewel lokaal soms talrijk, is de soort kwetsbaar voor overexploitatie door beperkt contact tussen populaties en relatief lage vruchtbaarheid. Populaties verminderen in het noorden van de Middellandse Zee<sup>ii</sup>.
- Status op de Rode Lijst:** NT - Bijna in gevaar (2009)<sup>ii</sup>. NT - Bijna in gevaar in Europese wateren (2015)<sup>vi</sup>.

## COMMERCIEEL BELANG

- In de Atlantische Oceaan: bijvangst bij bodemsleepnet-, kieuwnet-, warrelnet- en beugvisserij. Soms in pelagische sleepnetten.
- In de Middellandse Zee: gerichte visserij voor consumptie.
- In Noord-Europa gewoonlijk overboord gegooid, overlevingskansen zijn mogelijk hoog<sup>ii</sup>.

## HANTEREN

- Voorzichtig hanteren.
- Scherpe tanden.
- Schurende huid.

## EIKAPSEL

- Dooslengte 90 mm (exclusief hoorns).
- 30m breed.
- Lange hechtstraden op elke hoek<sup>i</sup>.
- Eikapsel lijkt op die van de Hondshaai, *Scyliorhinus canicula*.



## REFERENTIES

- Compagno, L. J. V.; 1984. FAO.
- Ellis, J. et al; 2009. IUCN Red List.
- Orton, J. H.; 1926. *Nature*.
- Soldo, A. et al; 2000. *Sci. Mar.*
- Reiner, F.; 1996. *Publ. Avuls. Inst. Port. Invest. Mar.*, Vol 2.
- Nieto, A. et al; 2015. European Red List of Marine Fishes.