

67572

GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE
VERENIGING
VOOR
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever
Alfons Pellegrons
Braumstraat 153
2120 Schoten
031/58.65.52

Secretariaat
Rene Swaelen
Acacialaan 13
2630 Aartselaar
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie
A. Vereycken
031/45.92.30

Bankrekening
Belgische Vereniging
voor Conchyliologie v.z.w.
(Gloria Maris)
610/4465950/64

VLIZ (vzw)
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

M A A R T 1 9 8 2

1. Zondag 7 maart 1982 te 10 uur in het lokaal
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen
" Nieuwjaar in Senegal "
Voordracht door de heer Thierry Backeljau
met dia's
de meegebrachte schelpen zullen te kijk zijn

2. Zondag 7 maart 1982 te 10 uur in het lokaal
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen
Aparte vergadering voor de jeugd :
Een diareeks over Sri Lanka
de gevonden schelpen worden tentoongesteld

3. Vrijdag 12 maart 1982 te 20 uur in het lokaal
Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de
studiegroep XENOPHORA onder leiding van de heer
E. Wils.

4. Vrijdag 19 maart 1982 te 20 uur in het lokaal
Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering van
de RAAD VAN BEHEER (+ inbinden en verzenden
maandblad)

Datum van uitgifte : 19 februari 1982

CALLIOSTOMA ZIZIPHINUM CONULOIDE (LAMARCK. 1822)


GEWONE TOLHOREN

Zoals de nederlandse benaming aanduidt lijkt deze schelp op een kleine tol met spitse punt.

Het is een breed horentje met 7 tot 10 windingen en geen navel.

Het oppervlak is bedekt met spiraalrichels die telkens aan de onderkant van een winding dikker zijn. Soms is deze richel ook nog gekarteld.

De mondopening ligt geheel aan de onderkant en is ruitvormig, zij heeft links een parelmoerachtige verdikking (callus) en wordt afgesloten door een cirkelrond operculum.



De kleur is veranderlijk. Geel tot paarsblauw en grijs, gevland. Soms zijn de verdikte richels alleen wit-paars geblokt. De platte onderkant is niet gevlekt. De binnenzijde is parelmoerachtig.

De schelp wordt tot 25 mm. hoog en 30 mm. breed. Calliostoma ziziphinum vindt men aan onze kust hier en daar in de vloedlijn, vooral in Oostduinkerke. Ook als dode schelpen tussen de stenen van de strandhoofden, mosselbanken en golfbrekers. Verder nog in Bretagne, Atlantische Oceaan en Middellandse zee.