

GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE
VERENIGING
VOOR
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

VLIZ (vzw)
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever

Alfons Pellegrons
Braumstraat 153
2120 Schoten
031/58.65.52

Secretariaat

Rene Swaelen
Acacialaan 13
2630 Aartselaar
031/88.34.06

Inlichtingen-Redactie

A.Vereycken
031/45.92.30

Bankrekening

Belgische Vereniging
voor Conchyliologie v.z.w.
(Gloria Maris)
610/4465950/64

DECEMBER 1984

1. Zondag 2 december 1984 te 10.00 uur in het lokaal
" Stella Maris ", Italiëlei 72 te Antwerpen
Voordracht door de heer J. WUYTS over :
" MURICIDAE, GENUS CHICOREUS " met dia's.
2. Zondag 2 december 1984 te 10.00 uur in het lokaal
" Stella Maris", Italiëlei 72 te Antwerpen
Aparte vergadering voor de jeugd :
' Schelpen vinden op Malta ' - door Ludo en Linda.
3. Vrijdag 14 december 1984 te 20.00 uur in het lokaal
Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de
studiegroep Xenophora onder leiding van de heer
E. Wils.
4. Vrijdag 21 december 1984 te 20.00 uur in het lokaal
Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering
van de Raad van Beheer + inbinden en verzenden
van maandblad.
5. B.V.C. West Vlaanderen vergadert op 16 december 1984
in het centrum De Lelei - weidestraat 81
te Assebroek (Brugge)

De eerstvolgende vergadering zal doorgaan op 6 januari 1985

Datum van uitgifte : 16 november 1984.

DONAX VITTATUS (DA COSTA, 1778)

Deze tweekleppige schelp uit de familie DONACIDAE, beter gekend als het ZAAGJE, wordt ongeveer 35 mm lang en half zo hoog. De gelijke kleppen zijn aan de voorzijde afgerond en aan de achterzijde afgeknot. De randen zijn sterk getand waarbij de tandjes in het midden van de onderrand breder zijn dan aan de voor- en achterrand. De top is naar achter geplaatst. Er is een glanzend, gepolijst periostracum en de schelp vertoont zeer fijne radiale lijnen vanaf de toppen. De kleur is bleekbruin en het pigment is soms geconcentreerd in banden. De binnenzijde is wit-geel.

Het zaagje heeft een uitwendig ligament en een heterodont slot, met in iedere klep twee kardinale tanden. Voor en achter de top is er nog één korte, weinig duidelijke laterale tand. Het dier heeft een sterke kielvormige voet en korte adembuizen of siphon's die bedekt zijn met lange vezels. Het leeft in schoon zand dicht bij de kust, meestal in de omgeving van golfbrekers, tot een diepte van 20 meter (dit gebied noemen we het Eulitoraal).

Verspreiding : Zeer algemeen van Noorwegen tot de Canarische Eilanden met inbegrip van de Middellandse Zee. Aangespoelde dode exemplaren vinden we dikwijls aan het strand. Zij zijn de enige vertegenwoordigers van de Donacidae aan onze kust.

