

gevoerd dier zal zijn. Hiervoor pleit de zeer beperkte uitbreiding, terwijl niets een verdere verspreiding in den weg staat. Opmerkelijk is het ook, dat de door den heer van Son genoemde Kaap Oensang volgens de meening der inlanders, zooals Jentink mededeelt, de plaats is, waar eertijds olifanten zouden losgelaten zijn.

De Heer **van Rees** gaat bij zijn voordracht uit van de stelling, dat de levensverschijnselen, de rol *van de cel* als elementair organisme eerst in den laatsten tijd meer op den voorgrond gekomen zijn. Bij twee verschillende door hem ingestelde onderzoekingen (gedaante-verwisseling van *Musca vomitoria* en ontwikkelingsgeschiedenis van *Botryllus*) was Spr. in de gelegenheid nauwkeuriger, dan dit tot nog toe geschied was, de veranderingen die de leucocyten tijdens het ontwikkelingsproces ondergaan te vervolgen en Spr. doet daarvan op uitvoerige wijze verslag zijn voordracht met teekeningen en op uitstekende wijze geconserveerde praeparaten opluisterende.

De Heer **Bottemanne** laat twee platte schelpen van een *Pecten*soort zien in November van dit jaar op de Westerschelde op de z.g. Kaloot verzameld.

De Heer **Maitland** vertoont een Ex. van *Cottus bubalis*, een voor de fauna nieuwen visch, die door een visscher van Nieuwediep vermoedelijk op Texelstroom gevangen was.

De Heer **Wenckebach** spreekt over de **gastrulatie in het ei van *Lacerta agilis***. Deze vindt plaats als een instulping van het bovenste primaire kiemblad eener twebladige kiemschijf. De instulping, de oerdarm, opent zich in de holte, die zich onder het blastoderm bevindt en verbindt zich naar voren toe met het onderste kiemblad. In den dorsalen wand van den oerdarm ontwikkelt zich de chorda en zijdelings daarvan het gastrale mesoderm. De ontwikkeling dezer beide organen zet zich in het primaire onderste kiemblad voort. Het peristomale mesoderm ontwikkelt zich rondom den oermond. Spr. toont de overeenkomst van dezen gastrulavorm met dien van Amphibiën en van Zoogdieren aan en meent bij *Lacerta* de brug gevonden te hebben, die genoemde diervormen verbindt.

De Heer **Hoek** deelt mede, dat de Heer Kok Ankersmit te Apeldoorn in een door zijn tuin loopend watertje eenige exemplaren heeft gevonden van *Nemachilus (Cobitis) barbatulus* en dat daarmede bewezen is, dat dit vischje inderdaad ook tot onze fauna behoort. Spr. vertoont een paar door den Heer Ankersmit gezonden exemplaren, evenals een exemplaar van *Trigla lineata* in Augustus van dit jaar door een visscher van Texel in de Noordzee nabij onze kust gevangen.