



Mycologische aspecten van het reservaat van Claire-Fontaine

door André HAVRENNE,
Secretaris van « Les Naturalistes
de Charleroi »

Talrijke soorten paddestoelen groeien in het zandig deel tussen de wilgen en berken, waaronder de spectaculaire vliegenzwam (*Amanita muscaria*), de krulzoom (*Paxillus involutus*), de berkeboleet (*Boletus scaber*), de rossige melkzwam (*Lactarius rufus*), die onder coniferen groeit.

Andere melkzwammen zijn begeleiders van de berken : de baardige melkzwam (*Lactarius torminosus*), harige melkzwam (*Lactarius pubescens*) en de zoetgeurende melkzwam (*L. glyciosmus*).

Onder de Russula's vindt men *Russula versicolor*, *R. exalbicans*, *R. atropurpurea*. Begeleiders van de wilgen zijn de ridderzwam (*Tricholoma cingulatus*) en de berke ridderzwam (*T. flavobrunneum*) met een geel vruchtlichaam.

Vezelvoeten, radijsvoeten (*Hebeloma*), wasplaten en gordijnzwammen werden eveneens aangetroffen. Op aanslibbingen in het els-esbos vindt men *Entoloma nidorosum*, met een chloorgeur; de geschubte inktzwam (*Coprinus comatus*). Op oude wilgenstammen, *Pholiota squarrosa* en de buisjeszwam (*Polyporus varius*); op populierenstammen *Gymnopilus spectabilis*, *Panellus serotinus*.

In 1978 werden 57 verschillende soorten geïnventariseerd.



Sponzswam, ook boskoraal genaamd
(*Sparassis crispa*).