

uit de reservaten

Werkweekend Rietsnijderij Waasmunster

Voor het tweede opeenvolgend jaar werd een werkweekend georganiseerd in een gewezen rietsnijderij langs de Durme. Een dertigtal werkwilligen kwamen opdagen, het merendeel waren deelnemers aan de cursus Natuurbeheer en Vrijwilligerswerk.

Met 3 bosmaaiers en de vele handen konden de 2 blokken in 1 dag bijna volledig gemaaid en opgeruimd worden. De grootste karwei was wel blok 2, die reeds 15 jaar niet meer werd gemaaid. Brandnetel, Wilgenroosje en Heggewinde hadden grotendeels de rietvegetatie verdrongen. Gehoopt wordt dat na een 5-tal jaar ook dit perceel weer volledig zal begroeid zijn met Dotterbloem. Wegens het zeer slechte weer beperkten we ons 's zondags tot het verder opruimen van het maaisel. Later zal de nog resterende niet gemaaide oppervlakte aangepakt worden.

Paul Durinck

De Fonteintjes in 1980

Voor het duinreservaat de Fonteintjes, te Zeebrugge is 1980 niet onaardig geweest.

Op botanisch vlak deden de orchideeën het goed: de Bijenorchis was er weer present op zijn broegere groeiplaats, de Keverorchis en Rietorchis werden voor het eerst waargenomen in de bosfontein. Voor de Rietorchis was dit op een kleine oppervlakte die in '79 bij wijze van proef gemaaid werd. Als broedvogels vermelden we in 't bijzonder het Woudaapje (2 koppels) en de Dodaars, die met 4 of 5 koppels het peil van 1970 bereikt. De Bergeend

Vergeet niet...

de zomerkampen van Natuur- en Vogelreservaten.

Werken in en voor de natuur in de Semoisvallei, eerste helft augustus

. Blankaart, tweede helft augustus

Voor jong en oud die de handen uit de mouw wil steken, en van een kampsfeer houdt.

Alle praktische regelingen volgen in het volgend nummer.

kwam voor 't eerst in het gebied broeden.

Het voorjaar viel op door een spectaculaire nooit voorheen geziene voorjaars-trek rond eind april, begin mei: Sperwer, Boomvalk, Kiekendieven, Visarend, Smelleken, Velduil, Purperreiger, Lepelaars, Noorse Gele Kwik, Duinpieper, Ortolaan en Bijeneters konden worden waargenomen.

De reptielen amfibieën en insecten fauna werden eveneens nauwlettend gevolgd. Naast 3 salamandersoorten werd de Levendbarende Hagedis herhaald waargenomen, en de Bruine Kikker, die een bleek-zandkleurige grondkleur heeft, blijkt tot een typische kustvorm te behoren en werd door Mevr. E. Hazelwood, een Britse Amfibieën-specialiste, onderzocht.

De belangrijkste beheerspunten voor 1981 zijn: het verder afwerken en vervangen van de afsluiting, wat voor dit reservaat, dat aan hoge toeristische druk bloot staat noodzakelijk is, en uiteraard zal ook het jaarlijks maai-beheer uitgevoerd worden.

Deze gegevens komen uit het jaarverslag 1980, opgemaakt door conservator J. Van Gompel.



De Fonteintjes