

Les Céphalopodes de l'Institut Français d'Afrique Noire

par W. ADAM.

M. le Professeur Th. Monod, directeur de l'Institut Français d'Afrique Noire, à Dakar (Sénégal) a bien voulu me confier l'étude des Céphalopodes de cet Institut.

Cette collection a été récoltée de 1941 à 1950 sur les côtes des Iles du Cap-Vert, du Sénégal, du Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Gabon. Elle comprend 93 exemplaires, conservés au formol, appartenant à 12 espèces. La plupart des exemplaires sont de jeunes individus.

Je publierai prochainement une étude détaillée sur les Céphalopodes de la côte africaine occidentale, basée sur les riches collections récoltées par l'Expédition Océanographique Belge dans les eaux côtières africaines de l'Atlantique Sud en 1948-1949. Aussi puis-je me contenter dans le présent travail de donner les dimensions des spécimens bien conservés, ainsi que quelques observations.

Famille SEPIIDAE.

Sepia officinalis hierredda RANG, 1837.

Sepia hierredda RANG, S., 1837, p. 75, pl. 100.

Sepia officinalis hierredda ADAM, W., 1941, p. 105.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

Rufisque (Sénégal), 11-VI-1947 (Coll. Paraiso) : 1 ♀.

REMARQUES :

Ce jeune spécimen, dont la largeur du manteau est 47 mm. possède un sépion dont la largeur atteint 40 % de sa largeur et la zone striée également 40 %.

Il est difficile de distinguer les jeunes spécimens des différentes races de seiches. La pointe postérieure assez forte de la coquille

de même que le lieu de capture du spécimen font supposer qu'il s'agit de la race *hierredda*.

En 1941 (W. Adam, p. 84), j'ai discuté la présence des races de seiches dans les eaux atlantiques. D'après nos connaissances actuelles, la race *hierredda* habite la côte atlantique africaine depuis la baie du Lévrier (Mauritanie) jusqu'à Pointa Albina (Angola).

***Sepia bertheloti* d'ORBIGNY, 1839.**

Sepia bertheloti D'ORBIGNY, A., 1839, p. 21, pl. II.

Sepia bertheloti ADAM, W., 1941, p. 109, pl. IV, fig. 2.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

a) Devant Libreville (Gabon), IX-1949 (Coll. « Beautemps-Beaupré » : 1 ♀.

b) Baie de Rufisque (Sénégal), Station 18, « Jean François », 28-I-1941 (coll. Th. Monod) : 1 ♂.

c) Dakar (Sénégal), Station 13, 22-I-1941 (coll. Th. Monod) : 1 ♂.

DIMENSIONS RELATIVES (1)			
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Numéros.			
Sexe.	♀	♂	♂
Manteau : longueur dorsale (en mm.)	38	46	88
— longueur ventrale	80	87	78
— largeur	50	46	40
— largeur y compris les nageoires.	68	67	59
Tête : longueur.	32	24	19
— largeur.	45	41	36
Nageoires : longueur.	95	93	82
— largeur.	10,5	15	13,5
Bras : Longueur, dorsaux.	45	37	41
— — dorso-latéraux.	39	35	33
— — ventro-latéraux.	42	35	39
— — ventraux.	45	39	51
Tentacule : longueur de la massue.	—	—	17
Ventouses : diamètre, bras sessiles.	1,6	1,1	1,5
— — tentacules.	—	—	1,7
Sépion : largeur.	33		
— zone striée.	60		

(1) La largeur du manteau est exprimée en mm. Toutes les autres mesures sont présentées en % de la longueur dorsale du manteau. Comme longueur des bras sessiles, j'ai mesuré la distance entre la première ventouse proximale et l'extrémité distale du bras.

DESCRIPTION :

Le plus grand mâle possède à la base des nageoires une série de points ou de taches roses et le long du bord des nageoires une ligne rose, continue ou quelques peu interrompue.

L'héctocotyle montre dans sa partie transformée 20 paires de ventouses plus petites.

Les ventouses distales des bras sont armées de 20 à 30 dents pointues, les autres ventouses ont le cercle corné irrégulièrement denticulé ou lisse.

Les ventouses tentaculaires sont denticulées de fines dents pointues.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE :

Sepia bertheloti habite exclusivement la côte occidentale de l'Afrique, depuis Ténériffe jusqu'au 15° Sud (côte d'Angola).

***Sepia elobyana* ADAM, 1941.**

Sepia elobyana ADAM, W., 1941, p. 121, fig. 12 ; pl. III, fig. 5.

DIMENSIONS RELATIVES		
	<i>a</i>	<i>b</i>
Numéros.....	♂	♀
Sexe.....	49	37
Manteau : longueur dorsale (en mm.).....	92	95
— longueur ventrale.....	65	59
— largeur.....	94	92
— largeur y compris les nageoires.....	41	32
Tête : longueur.....	53	51
— largeur.....	100	100
Nageoires : longueur.....	15	16
— largeur.....	49	40
Bras : longueur : dorso-latéraux.....	45	38
— — dorso-latéraux.....	45	38
— — ventro-latéraux.....	49	43
— — ventraux.....	31	32
Tentacule : longueur de la massue.....	2,9	2,2
Ventouses : diamètre, bras sessiles.....	1,0	1,1
— — tentacules.....	46	46
Sépion : largeur.....	63	51
— zone striée.....		

ORIGINE ET MATÉRIEL :

- a) Gorée (Sénégal), 10-VI-1947 : 1 ♂.
 b) Rufisque (Sénégal), 11-VI-1947 (coll. Paraiso) : 1 ♀.

DESCRIPTION :

Mâle : La face dorsale du manteau présente une réticulation très compliquée et symétrique de rides. Au centre des mailles, il y a le plus souvent un tubercule. La face ventrale du manteau, de même que les deux faces des nageoires sont dépourvues de rides et de tubercules. Sur la face dorsale de la tête on remarque une sculpture identique à celle du manteau. En dessous de chaque œil se trouve une grande verrue multifide. La face extérieure des bras dorsaux et dorso-latéraux est pourvue de rides transversales et la face dorsale extérieure des bras ventro-latéraux, de rides longitudinales.

Le manteau est brun rougeâtre avec la réticulation gris ardoise. La face dorsale de la tête est surtout gris ardoise avec quelques stries claires, longitudinales, se prolongeant le long de la ligne médiane des bras. Une bande foncée orne la base dorsale de chaque nageoire.

Les bras dorsaux et dorso-latéraux, larges à leur base et effilés à l'extrémité distale, sont carénés extérieurement de sorte que leur section transversale est triangulaire.

La plus grande partie de la face intérieure est couverte d'une vingtaine de rangées transversales de 4 ventouses. Ces ventouses, assez globuleuses, ont le cercle corné lisse dans les médianes et un cercle armé d'une dizaine de dents pointues du côté extérieur dans les latérales. Dans les 12 rangées proximales, les ventouses médianes sont beaucoup plus grandes que les latérales. Vers l'extrémité distale du bras, les ventouses latérales deviennent plus grandes que les médianes qui disparaissent complètement. C'est ainsi que les 4 derniers millimètres du bras ne possèdent que les ventouses latérales.

Les bras ventro-latéraux sont également triangulaires en coupe transversale et pourvus d'une crête extérieure. Leurs ventouses montrent la même disposition, elles sont cependant plus petites que celles des bras dorsaux ; les médianes ne sont que légèrement plus grandes que les latérales et toutes les ventouses ont leur cercle corné armé, dans leur moitié distale, de 10-14 dents pointues.

Les bras ventraux sont latéralement aplatis et pourvus d'une membrane natatoire bien développée, surtout dans la moitié basale du bras. Le bras gauche, hectocotylisé dans les 2/5 basaux de sa longueur, présente à sa base sept rangées de 4 ventouses transformées. Ces ventouses, très petites, sont groupées chaque

fois en 2 paires comme chez la plupart des seiches. La partie distale du bras porte une vingtaine de ventouses normales, comme celles des autres bras : les médianes sont beaucoup plus grandes que les latérales. Toutes les ventouses ont leur cercle corné armé d'une dizaine de dents.

Le bras ventral droit montre une transformation très caractéristique. La partie distale du bras ne diffère pas de celle du bras gauche, tandis qu'à la base du bras, nous trouvons d'abord deux rangées de 4 ventouses normales, suivies de 4 rangées de ventouses transformées, dont les latérales sont seulement plus petites que les autres ventouses latérales. Les médianes, au contraire, diffèrent complètement des ventouses normales. Alors que chez celles-ci, le cercle corné, armé de dents dans sa moitié distale, est entouré d'une zone de papilles, dans les ventouses transformées, dont la plus grande a un diamètre de 1,3 mm., il n'existe pas de zone de papilles et leur cercle corné, dépourvu de dents, est très fortement développé, surtout du côté proximal où il forme un large bord replié vers l'extérieur et dont la surface est granuleuse.

Dans tous les bras, les membranes protectrices sont bien développées ; aux extrémités effilées des bras, elles recouvrent complètement les ventouses.

Les tentacules ont leur pédoncule mince, aplati du côté intérieur, presque triangulaire en coupe transversale. La massue porte une membrane natatoire bien développée et les membranes protectrices minces, renforcées de brides musculaires transversales. Elle est couverte de petites ventouses subgales disposées au milieu du bras, en rangées obliques de 8. Vers les 2 extrémités de la massue, le nombre de ventouses par rangée est environ 6. Le cercle corné, entouré d'une zone de papilles porte dans sa moitié distale 8-10 longues dents quelque peu espacées.

La membrane interbrachiale est bien développée, sauf entre les bras ventraux.

Le sépion est acuminé dans sa partie antérieure, largement arrondi dans sa partie postérieure. Sa face dorsale, régulièrement arrondie, sans côtes et dépourvue d'une pointe postérieure, est très finement réticulée. La face ventrale présente une zone striée aplatie, plus étroite que le dernier locule. Le cône intérieur est complètement renversé et fixé au cône extérieur, très large, entourant une faible dépression postérieure. La zone striée présente un faible sillon médian.

Femelle. Les bras dorsaux et dorso-latéraux sont effilés et pourvus, à leur extrémité distale, de 2 rangées de ventouses. Sur tous

les bras, les ventouses médianes sont un peu plus grandes que les latérales ; toutes les ventouses sont armées, du côté distal, d'une dizaine de dents.

REMARQUES :

Comme l'holotype de *Sepia elobyana*, que j'ai décrit en 1941 (W. Adam, p. 121), se trouvait en assez mauvais état de conservation, j'ai redécrit ici en détail le mâle d'après le spécimen provenant de Gorée. Une comparaison de ces deux descriptions révèle plusieurs différences dont certaines s'expliquent facilement par le mauvais état de conservation du type (par exemple les bras arrondis extérieurement). Il reste cependant à expliquer une différence qui n'est certainement pas due à l'état de conservation : à savoir la massue tentaculaire. Chez le type, les parties distale et proximale de la massue tentaculaire gauche (le tentacule droit manque) portent plusieurs séries de petites ventouses, tandis que la partie du milieu est couverte d'un nombre restreint de ventouses, dont 4 à 5 au milieu sont beaucoup plus grandes que les autres. Chez les 2 spécimens de l'Institut de Dakar, la massue tentaculaire ne porte que de petites ventouses subégales, disposées au milieu du bras, en rangées obliques de 8.

Les sépions du type et du mâle de Gorée se ressemblent fortement ; celui du dernier spécimen est cependant beaucoup plus large que celui du type.

Les 2 mâles possèdent les ventouses transformées, très caractéristiques, du bras ventral droit.

Malgré la différence signalée entre les ventouses des tentacules, je crois pouvoir considérer les deux spécimens de l'Institut de Dakar comme appartenant à *Sepia elobyana* ; la massue tentaculaire du type pourrait constituer une anomalie.

L'espèce n'est connue jusqu'à présent que par 3 spécimens provenant des Iles Eloby (Golfe de Guinée) et du Sénégal.

Sepiella ornata RANG, 1837.

Sepia ornata RANG, S., 1837, p. 76, pl. 101.

Sepiella ornata ADAM, W., 1939, p. 102, 1941, p. 124.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

a) Devant Douala (Cameroun), XI-1949 (coll. « Beautemps-Beaupré ») : 1 ♂ (longueur du manteau : 41 mm.).

b) Au large de Freetown (Sierra Leone), 1^{re} quinzaine de mars 1948 (coll. J. Cadenat) : 1 ♀.

c) Devant Tabou (Côte d'Ivoire), 7-II-1950 (coll. « Beautemps-Beaupré ») : 1 ♂, 1 ♀.

DIMENSIONS RELATIVES			
	c_1	c_2	b
Numéros.	♂	♀	♀
Sexe.			
Manteau : longueur dorsale (en mm.)	46	46	51
— longueur ventrale.	82	85	82
— largeur.	52	56	53
— largeur y compris les nageoires.	74	78	73
Tête : longueur.	35	33	31
— largeur.	46	48	39
Nageoires : longueur.	89	96	94
— largeur.	16	15	16
Bras : longueur : dorsaux.	54	41	33
— — dorso-latéraux.	50	39	33
— — ventro-latéraux.	56	41	35
— — ventraux.	59	52	41
Tentacule : longueur de la massue.	—	—	29
Ventouses : diamètre, bras sessiles.	2,0	1,5	1,4
— — tentacules.	—	—	0,6

REMARQUES :

En 1939, dans une révision du genre, j'ai donné une description de cette espèce (W. Adam, p. 102). Prochainement, je pourrai compléter cette description par l'examen d'une cinquantaine d'exemplaires, provenant de l'Expédition Belge dans l'Atlantique Sud.

L'espèce n'est connue que de la côte africaine occidentale depuis le Cap Blanc jusqu'à Benguela (Angola).

Famille LOLIGINIDAE.

Alloteuthis africana ADAM, 1950.

Alloteuthis africana ADAM, W., 1950, p. 1.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

a) Au large de M'bour (Sénégal), 19-V-1949 (coll. « Gérard Tréca » Delais) : 6 ♂, 5 ♀.

b) Devant Freetown (Sierra Leone), 5-III-1948 (coll. J. Cadenat) : 5 ♂.

DIMENSIONS RELATIVES		b_1 ♂	a_1 ♂	b_2 ♂	b_3 ♂	a_2 ♂	a_3 ♂	a_4 ♂	a_5 ♂	b_4 ♂	b_5 ♂	a_6 ♀	a_7 ♀
Numéros.....													
Sexe.....													
Manteau : longueur en mm.....	138		137	136	112	100	88	85	82	80	41	83	77
— largeur.....	5,8		9,5	7,3	—	11	13,5	13,5	13,5	12	19,5	15,5	15,5
Tête : longueur.....	5,1		5,8	6,2	7,6	10	10	10	9,8	9,4	17	13	13
— largeur.....	6,5		8,4	7,3	8,0	11	13,5	13	13,5	11	18,5	13	14,5
Nageoires : longueur.....	60		63	64	63	63	58	56	59	59	41	59	58
— largeur (totale).....	13		17	14,5	14,5	20	25	24	26	24	32	29	27
Bras : longueur, dorsaux.....	4,4		6,2	5,1	5,8	10	10	9,4	9,8	8,1	12	11	9,1
— — dorso-latéraux.....	7,2		10	8,1	8,9	14	16	15,5	14,5	12,5	19,5	15,5	15,5
— — ventro-latéraux.....	8,7		—	8,8	10,7	18	18	17,5	18,5	16	24,5	18	18
— — ventraux.....	8,0		11	8,1	9,8	14	15	14,5	16	14	22	17	15,5
Tentacule : longueur de la massue.....	4,7		—	5,5	5,4	9	9,1	8,2	10,5	8,5	13,5	—	—
Ventouses : diamètre : bras sessiles...	0,5		0,6	0,6	0,6	1,0	1,1	1,2	1,1	0,8	1,2	1,1	1,0
— — tentacules	0,6		—	0,6	0,7	1,0	0,9	0,8	1,0	1,0	1,5	—	—
Hectocotyle : partie transformée.....	45		43	41	45	43	46	44	42	36	—	—	—

REMARQUES :

Alloteuthis africana se distingue d'*Alloteuthis subulata* (Lamarek) : 1) par la forte différence entre les tailles maxima des deux sexes, les mâles, étant beaucoup plus grands, atteignent une longueur du manteau de 195 mm., les plus grandes femelles ne mesurent que 86 mm. ; 2) par sa forme très élancée ; 3) par ses nageoires ovalaires étroites et sa queue très longue ; 4) par ses bras très courts.

L'espèce habite exclusivement la côte occidentale de l'Afrique depuis le Sénégal jusqu'à Pointa das Salinas (Angola).

Lolliguncula mercatoris ADAM, 1941.

Lolliguncula mercatoris ADAM, W., 1941, p. 125, fig. 13-18 ; pl. III, fig. 6.

DIMENSIONS RELATIVES						
NUMÉROS	SEXE	MANTEAU	LARGEUR	TÊTE	NAGEOIRES	
		LONGUEUR EN MM.		LARGEUR	LONGUEUR	LARGEUR
d_1	♂	19	40	40	34	58
d_2	♂	19	37	37	32	53
d_3	♂	19	40	37	34	55
d_4	♂	18	40	39	33	58
d_5	♂	18	39	39	33	56
d_6	♂	18	39	36	39	58
d_7	♂	17,5	37	40	31	57
d_8	♂	17	35	35	35	56
d_9	♂	17	41	41	35	56
d_{10}	♂	15,5	39	39	35	58
c	♀	22	—	34	34	61
d_{11}	♀	22	41	36	36	64
d_{12}	♀	18,5	30	32	38	54
a_1	♀	16,5	36	33	36	55
a_2	♀	16	38	38	38	53
d_{13}	♀	16	38	31	31	56
d_{14}	♀	16	38	38	31	62
a_3	♀	15	40	37	37	60
a_4	♀	15	33	35	33	53
a_5	♀	14,5	38	36	31	55
a_6	♀	14	39	36	32	57
a_7	♀	13,5	41	39	37	59

ORIGINE ET MATÉRIEL :

- a) Lomé (Togo), 29-XI-1947 (coll. Cadenat-Paraiso) : 7 ♀.
 b) Au large de Freetown (Sierra Leone), III-1948 (coll. Cadenat) :
 1 ♂.
 c) Bonthe (Sherbro) (Sierra Leone), 15-III-1948 (coll. Cadenat) :
 1 ♂, 1 ♀.
 d) Cercle d'Anecho (Togo), 3-XII-1947 (coll. Cadenat-Paraiso) :
 18 ♂, 15 ♀.

REMARQUES :

Les bras latéraux ont leurs ventouses ventrales plus grandes que les dorsales. Chez les petits spécimens, les nageoires semi-circulaires dépassent légèrement l'extrémité postérieure du corps.

Même chez les plus petits mâles, l'héctocotyle est déjà bien différencié par de longues papilles.

L'espèce habite exclusivement la côte africaine occidentale depuis Angra de Cintra (Rio de Oro) jusqu'à la Baie de Luderitz (Afrique du Sud).

Famille OMMASTREPHIDAE.

Illex coindetii VÉRANY, 1837.

Loligo coindetii VÉRANY, J. B., 1837, p. 94, pl. 4.

Illex coindetii NAEF, A., 1923, p. 429, fig. 216-222.

Illex coindetii ROBSON, G. C., 1926, p. 179, fig. 13-15.

Illex coindetii DESBROSSES, P., 1938, p. 342.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

Gorée (Sénégal), 31-III-1946 : 1 ♀.

DIMENSIONS RELATIVES :

Manteau : longueur dorsale.	91
Tête : longueur.	20
— largeur.	18,5
Nageoires : longueur.	38
— largeur.	50
Bras : longueur : dorsaux.	31
— dorso-latéraux.	37
— ventro-latéraux.	35
— ventraux.	30
Tentacule : longueur de la massue.	30
Ventouses : diamètre, bras sessiles.	1,8
— — tentacules.	2,0

REMARQUES :

G. C. Robson (1926, p. 162) donne comme limite méridionale de cette espèce 26° 3' N.P. Desbrosses (1938, p. 343) la signale jusqu'à 9° 14' N. D'après G. Grimpe (1925, p. 76) le genre *Illex* habite exclusivement l'Atlantique Nord.

Or, les très riches collections de l'Expédition Belge dans l'Atlantique Sud démontrent qu'*Illex coindetii* s'étend jusqu'à 14° S. et que l'espèce est probablement la plus commune de la côte africaine.

Todaropsis eblanae BALL, 1841.

Loligo eblanae BALL, R., 1941, p. 363, fig. 1-7.

Todaropsis eblanae NAEF, A., 1923, p. 438, fig. 223-227.

Todaropsis eblanae ROBSON, G. C., 1924, p. 614 ; 1926, p. 185.

Todaropsis eblanae DESBROSSES, P., 1938, p. 344.

Todaropsis eblanae THORE, S., 1945, p. 49.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

Gorée (Sénégal), 31-I-1950 (coll. Cadenat) : 1 ♀.

DIMENSIONS RELATIVES :

Manteau : longueur dorsale.	30
— largeur.	33
Tête : longueur.	23
— largeur.	32
Nageoires : longueur.	37
— largeur.	60
Bras : longueur : dorsaux.	30
— dorso-latéraux.	40
— ventraux-latéraux.	40
— ventraux.	33
Tentacule : longueur de la massue.	32
Ventouses : diamètre, bras sessiles.	2,0
— — tentacules.	2,3

REMARQUES :

Cette espèce, que G. Grimpe (1925, p. 80) considérait comme habitant exclusivement l'Ouest et le Sud-Ouest de l'Europe, vit en réalité également sur toute la côte africaine occidentale jusqu'en Afrique du Sud.

Ommastrephes pteropus STEENSTRUP, 1855.

Ommatostrephes pteropus STEENSTRUP, J., 1855, p. 200.

Stenoteuthis pteropus PFEFFER, G., 1912, p. 490, pl. 37, fig. 1, pl. 38; pl. 39, fig. 3-4.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

a) au large de la Côte d'Ivoire (contenu stomacal d'un *Thynnus albacora* LOWE) (coll. « Pierre Idrac ») : 5 jeunes (longueur du manteau : 48-64 mm.), dont 3 en mauvais état.

b) Saõ Thiago (Iles du Cap-Vert), 2-XI-1948 (coll. Th. Monod) : 4 jeunes.

DIMENSIONS RELATIVES						
Numéros.	b_1	a_1	a_2	b_2	b_3	b_4
Manteau : longueur dorsale.	65	64	60	57	41	32
— largeur.	20	19	19	19	17	22
Tête : longueur.	18,5	22	21	17,5	17	19
— largeur.	18,5	—	19	18,5	19,5	20
Nageoires : longueur.	37	36	35	37	32	28
— largeur.	65	59	58	60	51	50
Bras : longueur : dorsaux.	23	28	27	23	22	22
— — dorso-latéraux.	28	33	33	26	26	25
— — ventro-latéraux.	29	36	35	25	27	28
— — ventraux.	26	30	32	23	24	22
Tentacules : longueur de la massue.	25	28	30	17,5	19,5	—
Ventouses : diamètre : bras sessiles.	1,2	1,1	1,3	1,2	1,2	—
— — tentacules.	1,2	—	—	1,1	0,7	—

REMARQUES :

A cause de la présence de 0-2 ventouses, situées sur la massue tentaculaire, proximale du tubercule proximal, j'ai considéré ce matériel comme appartenant à *Ommastrephes pteropus* (STEENSTRUP).

Dans le mémoire sur les Céphalopodes de l'Expédition Belge, je discuterai la valeur de ce caractère.

Famille OCTOPODIDAE.

Octopus vulgaris LAMARCK, 1798.

Octopus vulgaris LAMARCK, J. B., 1798, p. 130.

Octopus vulgaris ROBSON, G. C., 1929, p. 57.

Octopus vulgaris PICKFORD, G. E., 1945, p. 708, fig. 1-7, 10-11, 21.

Octopus rugosus (BOSC, 1792) ROBSON, G. C., 1929, p. 63.

Octopus rugosus (BOSC, 1792) ADAM, W., 1941, p. 135.

DIMENSIONS RELATIVES (1)														
Numéros	<i>b</i>	<i>g</i>	<i>c</i>	<i>i</i>	<i>a</i>	<i>c</i> ₂	<i>f</i>							
Sexe	♂	♂	♂	♀	♀	♀	♀							
Manteau :														
Long. en mm	28	22	20	60	33	24	21							
Largeur	61	68	70	68	58	75	71							
Tête :														
Longueur	64	50	60	67	36	54	81							
Largeur	68	73	65	55	54	62	81							
Bras :														
	g.	dr.	g.	dr.	g.	dr.	g.	dr.	g.	dr.	g.	dr.	g.	dr.
long. dorsaux	275	—	275	255	—	275	275	176	166	—	—	300	—	—
dorso-latéraux	—	320	325	370	—	360	340	340	197	182	335	285	—	410
ventro-latéraux	—	285	370	305	—	285	335	335	197	182	310	295	—	370
ventraux	265	280	260	260	265	—	315	315	182	188	290	270	260	300
Membrane inter-brachiale :														
A	16,5	15	14	17	15,5	15	17,5							
B	22	17,5	16,5	19,5	23	19	18,5							
C	25,5	19,5	22	22	24,5	25	20,5							
D	25,5	16	19,5	22	29	24	22							
E	20	15	15,5	19,5	21,5	12,5	18,5							
Hectocotyle :														
Long. ligule														
indice I	2,9	2,2	3,5											
Indice II	8,2	6,8	10											
Long. calamus	65	33	35											
Pénis :														
Longueur	18	20	20											
Ventouses :														
Diamètre,														
bras dorsaux	11,8	10,4	10	—	7,6	9,6	11							
dorso-latéraux	15,7	19,5	15	—	7,9	12,5	16,7							
ventro-latéraux	15,7	15,5	15	11,7	9,1	12,5	14,3							
ventraux	11,0	11,8	10	—	7,6	9,6	12,4							

(1) Les dimensions relatives des *Octopoda* ont été calculées d'après la méthode de G. C. Robson (1929, p. 24) avec les exceptions suivantes : 1) la longueur des bras est exprimée en % de la longueur du manteau; 2) l'indice I pour la ligule est celui de Robson; l'indice II donne la longueur de la ligule en % de la longueur dorsale du manteau.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

- a) Gorée (Sénégal), 31-I-1950 (coll. Cadenat) : 1 ♀.
- b) Gorée (Sénégal), 24-IX-1946 : 1 ♂.
- c) Gorée (Sénégal), 10-VI-1947 : 1 ♂, 1 ♀.
- d) Gorée (Sénégal), 31-III-1946 : 1 ♂, 1 jeune.
- e) Gorée (Sénégal), 14-I-1949 (coll. Paraiso) : 1 ♀.
- f) Au large de Freetown (Sierra Leone), 1^{re} quinzaine de mars 1948 (coll. J. Cadenat) : 1 ♀.
- g) Rufisque (Sénégal), 11-VI-1947 (coll. Paraiso) : 1 ♂.
- h) Dakar, phare des Almadies (Sénégal), 2-IX-1947 (coll. P. L. Dekeyser) : 1 ex.
- i) Dakar, Anse Bernard (Sénégal), 30-XI-1947 (coll. Th. Monod) : 1 ♀.
- j) Gorée (Sénégal), VI-1948 (coll. J. Cadenat) : 1 jeune.

REMARQUES :

Les spécimens en bon état de conservation ont leur peau très rugueuse et le plus souvent pourvue d'une réticulation foncée ; les autres l'ont plus ou moins lisse.

Les spermatophores ne diffèrent pas beaucoup des spermatophores d'*Octopus vulgaris*, représentés par G. E. Pickford (1945).

G. E. Pickford (1945, p. 727) est d'avis que dans la région caraïbe et sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord, il n'y a qu'une seule espèce du groupe d'*Octopus vulgaris* LAMARCK. Les jeunes de cette espèce présentent les caractères d'*Octopus rugosus* (Bosc), les adultes ceux d'*Octopus vulgaris* LAMARCK.

Le matériel des Octopodes de la côte africaine occidentale que j'ai pu examiner, semble confirmer l'hypothèse de G. E. Pickford. Comme les spécimens de l'Institut de Dakar sont tous des jeunes, je dois remettre à une date ultérieure la discussion de ce problème.

Il est à remarquer que la ligule des 3 spécimens mâles observés est assez grande. Seulement, j'ai l'impression que la longueur relative de la ligule diminue au cours de la croissance.

Octopus macropus RISSO, 1926.

Octopus macropus RISSO, A., 1826, p. 3.

Octopus macropus ROBSON, G. C. 1929, p. 101.

Octopus macropus ADAM, W., 1941, p. 136 ; 1941 a, p. 1.

Octopus macropus PICKFORD, G. E., 1945, p. 736.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

Gorée (Sénégal), 29-XII-1946 (coll. J. Cadenat) : 1 ♀.

DIMENSIONS RELATIVES :

Manteau : longueur (en mm.).....	65	
— largeur.....	58	
Tête : longueur.....	80	
— largeur.....	51	
		g. dr.
Bras : longueur : dorsaux.....	630	570
— dorso-latéraux.....	—	540
— ventro-latéraux.....	630	550
— ventraux.....	510	530
Membrane interbrachiale : A.....	6,0	
— B.....	8,5	
— C.....	10,0	
— D.....	10,0	
— E.....	6,0	
Ventouses : diamètre : bras dorsaux.....	10,8	
— bras dorso-latéraux.....	6,9	
— bras ventro-latéraux.....	6,9	
— bras ventraux.....	5,4	

REMARQUES :

La radule montre la sériation caractéristique de l'espèce (voir W. Adam, 1941 *a*, p. 4 et 1941, p. 137, fig. 19).

Jusqu'à présent l'espèce n'avait pas encore été signalée au Sud des Iles Canaries.

***Eledone caparti* ADAM, 1950.**

Eledone caparti ADAM, W., 1950, p. 7.

ORIGINE ET MATÉRIEL :

Au large de Freetown (Sierra Leone), 1^{re} quinzaine de mars 1948 (coll. J. Cadenat) : 1 ♀.

DIMENSIONS RELATIVES :

Manteau : longueur en mm.....	43
— largeur.....	65

Tête : longueur.	72
— largeur.	53
Bras : longueur : dorsaux.	255
— dorso-latéraux.	230
— ventro-latéraux.	220
— ventraux.	200
Membrane interbrachiale : A.	30
— B.	32
— C.	31
— D.	27
— E.	21
Ventouses : diamètre : bras dorsaux.	9,3
— bras dorso-latéraux.	9,3
— bras ventro-latéraux.	10,4
— bras ventraux.	8,6

REMARQUES :

L'animal est d'un brun rougeâtre assez foncé avec de petits chromatophores. Sa peau est légèrement rugueuse par suite de la fixation, mais il n'y a ni papilles, ni cirrhes.

La membrane interbrachiale, bien développée, se poursuit le long des bras. Ceux-ci portent chacun environ 75 ventouses..

Je considère ce spécimen comme appartenant à *Eledone caparti* malgré quelques légères différences avec le matériel original de cette espèce.

Les bras de l'exemplaire de l'Institut de Dakar ne montrent pas la forte inégalité que j'ai observé chez les individus, provenant de l'Expédition Belge. Ceci peut être partiellement attribué à une fixation différente.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

- ADAM (W.). — 1939, *Cephalopoda*. II (*Siboga Exp. Mon.* LV^b, p. 35-122).
- ADAM (W.). — 1941, *Cephalopoda*. (Rés. Sci. Crois. Navire-École « Mercator », III) (*Mém. Mus. R. Hist. Nat. Belg.*, série 2, t. 21, p. 83-162).
- ADAM (W.). — 1941^a, Notes sur les Céphalopodes, XV. Sur la valeur diagnostique de la radule chez les Céphalopodes Octopodes (*Bull. Mus. R. Hist. Nat. Belg.*, XVII, n° 38, p. 1-19).
- ADAM (W.). — 1950, *Idem.*, XXII. Deux nouvelles espèces de la côte africaine occidentale. (*Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg.*, XXVI, n° 45, p. 1-9).
- BALL (R.). — 1841, On a species of *Loligo* found on the shore of Dublin Bay (*Proc. Roy. Irish Acad.*, I, p. 362-364).

- DESBROSSES (P.). — 1938, Céphalopodes pêchés au cours de la cinquième croisière (*Rev. Trav. Pêches marit.*, 11, p. 335-347).
- GRIMPE (G.). — 1925, Zur Kenntnis der Cephalopodenfauna der Nordsee (*Wiss. Meeresunters. Abt. Helgoland*, N. F. 16, H. I. Abh. 3, p. 1-124).
- LAMARCK (J. B.). — 1798, Extrait d'un mémoire sur le genre de la Sèche, du Calmar et du Poulpe, vulgairement nommés Polypes de mer (*Bull. Soc. Philom. Paris*, II, p. 129-131).
- NAEF (A.). — 1923, Die Cephalopoden (*Fauna Flora Neapel*, Mon. 35).
- ORBIGNY (A. D'). — 1838, Mollusques; Échinodermes, Foraminifères et Poly-piers recueillis aux Iles Canaries par MM. Webb et Berthelot. (*Paris*).
- PFEFFER (G.). — 1912, Die Cephalopoden der Plankton Expedition (*Ergebn. Plankton*, Exp. II).
- PICKFORD (G. E.). — 1945, Le Poulpe américain : A Study of the littoral *Octopoda* of the Western Atlantic (*Trans. Connect. Acad.* 36, p. 701-811).
- RANG (S.). — 1837, Documents pour servir à l'histoire naturelle des Céphalopodes cryptodibranches (*Mag. Zool.*, VII, p. 1-77).
- RISSE (A.). — 1826, Histoire naturelle... de l'Europe Méridionale, IV.
- ROBSON (G. C.). — 1924, On the Cephalopoda obtained in South African waters by Dr. J. D. F. Gilchrist in 1920-21 (*Proc. Zool. Soc. London*, p. 589-686).
- ROBSON (G. C.). — 1926, *Cephalopoda* from N. W. African waters and the Biscayan Region : (*Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc*, VI, p. 158-195).
- ROBSON (G. C.). — 1929, A Monograph of the recent *Cephalopoda*. I. (*London*).
- STEENSTRUP (J.). — 1855, Kjæber af en kolossal Blæksprutte *O. pteropus* (*Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl.*, p. 199-200).
- THORE (S.). — 1945, On the *Cephalopoda* of Professor O. Carlgren's Expedition to South Africa in 1945. (*Förh. fysiogr. Sällsk. Lund.* 15, p. 49-57).
- VÉRANY (J. B.). — 1837, Mémoire sur six nouvelles espèces de Céphalopodes trouvées dans la Méditerranée à Nice (*Mém. R. Acad. Sci. Torino*, (2), I., p. 91-90).