

rapprochent beaucoup des *Tarachodes*, mais qu'il en diffère par la brièveté de son prothorax et des filets articulés du dernier segment de son abdomen, il faut en former un sous-genre dans le grand genre *Mantis* en lui assignant les caractères suivants :

PERLAMANTIS. Prothorax court, à peine plus long que le mésothorax ; tête transversale, sans corne. Antennes sétacées, ayant à peine la moitié de la longueur du corps. Élytres et ailes semblables, allongées, transparentes, à nervures longitudinales et transverses semblables à celles des perles. Pattes antérieures ravisseuses, ayant les cuisses armées, en dedans et au milieu, de quatre fortes épines dont l'une est articulée. Abdomen terminé par deux filets ou appendices courts, ne dépassant pas les pièces de l'organe générateur dans les mâles, aplatis et plus épais au bout ; pattes grêles.

Perlamantis Allibertii. Obscure fusca, corpore subtus pedibusque fusco-flavidis, nigro-maculatis. Elytris alisque sub-hyalinis, fusco-nervosis. L. 15, enverg. 30 mill.

Nous donnerons une figure détaillée et une description plus étendue de cet intéressant insecte dans un prochain numéro du *Magasin de Zoologie*.

M. Allibert a rencontré cet Orthoptère à Pulmoissons (Basses-Alpes), et il n'en a trouvé qu'un seul individu qu'il nous a généreusement remis. Nous avons cru devoir dédier ce curieux insecte au jeune médecin et zélé entomologiste qui l'a découvert, afin de l'encourager à faire de nouvelles recherches dans cette partie de la France encore si peu connue sous le rapport de sa faune entomologique.

DESCRIPTION d'une nouvelle espèce du genre *Myrmedonia*,
par M. CHEVROLAT.

Dans le *Genera et species Staphilinorum* de M. Erichson, ce genre renferme 26 espèces, dont 9 appartiennent à l'Europe. J'ai cru intéressant d'en faire connaître une qui me paraît entièrement nouvelle et ne fréquente que les bords de l'Océan. Quelques exemplaires de cette espèce m'ont été donnés par M. Pilate, ils proviennent des environs de Calais.

Myrmedonia nigriventris. Alata lutea. Caput fuscum, ultimo articulo antennarum, oculisque nigris ; thorax planus, antice, posticeque truncatus, basi angustior, lateribus rotundatis ; Ely-

tra brevia, intus oblique truncata; abdomen marginatum, duobus penultimis segmentis, aut tribus ultimis, nigris seu piceis; setis tiliarum extus fere spinosis. L. 3 1/2. l. 1 mill.

DIPTÈRES nouveaux d'Italie, par M. C. RONDANI, de Parme.

G. SPAZIGASTER, Rond. (abdomen spathulatum), fam. *Syrphici* Meig.; *Syrphinae* Rondani.

Antennarum, articuli primi breves; tertius subrotundatus, præcedentibus conjunctim longior. Arista pilosa, pilis breviusculis. Facies paulo excavata, gibbosa; epistoma non distincte porrectum. Oculi nudi. Alarum vena prima, costalem attingens antequam perveniat contra transversam exteriorem; quarta non valde excavata, sed recta. Abdomen compressum, basi satis coarctatum sed non lineare, segmentis secundo, tertio et quarto longitudine subæquali. Pedes postici non incrassati, femoribus non spinulosis nec denticulatis.

S. apennini Rondani. Antennæ, arista, frons, facies nigrae. Thorax, scutellum et abdominis segmentum primum nigris, vix subvirescentibus. Abdominis segmentum secundum rubeum, basi tantum anguste nigrum; tertium omnino rubeum; quartum basi late rubeo-fasciatum, postice nigrum, fascia rubea lateribus latiore; quintum nigrum. Venter ut pars superior abdominis, tamen fascia rubea quasi segmenti lateribus non latiore. Squamæ albidæ. Halteres capitulo lutescente. Pedes nigri, geniculis et tiliarum basi rufescentibus. Alæ paulo fuliginosæ præsertim in medio; areola secunda apice nigricante. — Long. fœm. 9 mill.

Hujus speciei duo tantum fœminæ inventæ fuerunt in Apennino altiore ditionis Parmensis a conterraneo entomologo doctore Bertè, quæ ipsius dono in collectione mea asservantur.

Merodon armipes, Rondani. — Aneo-nigricans; luteo-fulvescente-pilosus. Facies et frons pilis pallidioribus; vertex antice pilis nigris, postice rufo-pallidis. Antennæ et arista omnino nigrae; squamæ albicantes, margine et ciliis luteo fulvis. Abdominis segmenta omnia postice pilis pallide luteis marginata; secundum lateribus macula obscure-rufa, subtrigona. Alæ paulo fuscescentes. Pedes nigri, tiliarum omnium basi, et tarsorum posticorum articulis primis tribus rufescentibus. Coxa postice apophysii retro satis producta, et tuberculo interiori subinterme-