

1. De broedperiode kunnen we als afgesloten beschouwen en was vrij ongunstig door de slechte weersomstandigheden. Toch waren er voor heel wat soorten meer broedparen dan de vorige jaren. Zo ondermeer :
 - 56 paartes kluut (*Recurvirostra avocetta*),
 - 48 scholeksters (*Haematopus ostralegus*),
 - 43 tureluurs (*Tringa totanus*),
 - + 65 bergeenden (*Tadorna tadorna*),
 - ≠ 2.800 paartjes kokmeeuw (*Larus ridibundus*),
 - 709 paartjes visdiefje (*Sterna hirundo*).
2. De tweede helft van augustus is een zeer belangrijke periode voor het waarnemen van prooivogels op trek. Zo zien we in het Zwin momenteel praktisch dagelijks enkele torenvalkjes (*Falco tinnunculus*), buizerden (*Buteo buteo*), bruine kiekendieven (*Circus aeruginosus*). Ook zeldzamere soorten werden onlangs nog in het reservaat gezien : boomvalk (*Falco subbuteo*), grauwe kiekendief (*Circus pygargus*) en zelfs de zeer zeldzame visarend (*Pandion haliaëtus*) op 15 augustus.
3. De zeldzame kleine zilverreiger (*Aigretta garzetta*) die hier voor het eerst gezien werd op 6 juni ll. kreeg het gezelschap van nog 2 andere exemplaren. Die 3 vogels werden tot op heden zonder onderbreking in het Zwin of in de onmiddellijke omgeving waargenomen. Deze overzomering wijst er wel op dat het gebied zeer geschikt is.
4. Op de golfbrekers zijn enkele interessante waarnemingen mogelijk. Op 24 augustus waren er onder andere 36 eider-eenden (*Somateria molissima*) en 2 grote zeeëenden (*Melanitta fusca*). Steenlopers (*Arenaria interpres*) en paarse strandlopers (*Cilidris maritima*) zijn dagelijkse gasten op de golfbreker. De eerste paarse strandloper werd op 21 augustus geobserveerd.
5. September is het hoogepunt van de steltloper trek. Dagelijks valt er trek te noteren van groepjes tureluurs (*Tringa totanus*), groenpootruiters (*Tringa nebularia*), oeverlopers (*Tringa hypoleucos*), bonte strandlopers (*Calidris alpina*), 2 soorten wulpen en 2 soorten grutto's.
6. Momenteel staat de schorre van het Zwin in volle bloei. Zowat alle typische planten -zoutminnende planten - van het gebied bloeien : zeekraal, obione, klein schorrekruid en natuurlijk ook het lamsoor "Zwinneblomme". Met aandrang wordt gevraagd :
 - er eventueel slechts een klein tuiltje te plukken ;
 - nooit wortels uit te trekken ;
 2 factoren die rooibouw betekenen en deze plant kunnen doen verdwijnen.

De Conservator,

Guido Burggraeve.