


Rugzijde ♀



Buikzijde ♀


3

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Raja microocellata (Montagu, 1818).

VERSPREIDING

Noordoost-Atlantische Oceaan: rond de Britse eilanden (vnl. Bristolkanaal en Engels Kanaal iii) tot Marokko. Niet in de Noordzee en Middellandse Zeeⁱⁱⁱ.



LOKALE NAMEN

KLEINOOGROG, Bastaardrog, wilde keelrog, Small-eyed Ray (UK), Raie Melee (Fr), Raya Colorado (Es).

KENMERKEN

- 1 Opvallend kleine ogen.
- 2 Staart iets korter dan lichaam.
- 3 Rij van 50 stekels op de middenlijn tot eerste rugvin.
- 4 Stekels nabij het oogⁱⁱ.

KLEUR

- Rugzijde licht zandbruin.
- Lichte banden evenwijdig aan randen van lichaamsrand.
- Regelmatig patroon van lichtere strepen, stippen en vlekken.
- Buikzijde wit^{iv}.

BIOLOGIE EN GROOTTE

- Bij geboorte: ~13 cm. Bij geslachtsrijpheid: ~58 cm. Max TL: 90 cm^{iv}.
- Juvenielen eten kleine kreeftachtigen. Volwassenen bijna enkel beenvissen, voornamelijk Zandspiering^{vii}.
- Eens ingegraven zijn alleen de ogen en ademgaten zichtbaar^{ix}.
- Broedtijd in eikapsel rond de 7 maanden^{ix}.

GELIJKAARDIGE SOORTEN

- *Leucoraja circularis*, **Zandrog**
- *Leucoraja fullonica*, **Kaardrog** (juv.)
- *Leucoraja naevus*, **Grootoogrog**
- *Raja brachyura*, **Blonde Rog**
- *Raja montagui*, **Gevlekte Rog**
- *Raja undulata*, **Golfrog**

HABITAT

- Levend op of nabij de bodem tot ~100 m^{ix}.
- Aangetroffen op zachte substraten met een voorkeur voor zandbanken en zandige baaien^{vi}.

BESCHERMINGSSTATUS

- Mogelijk kwetsbaar voor overexploitatie door beperkte verspreiding, concentratie van populatieⁱⁱⁱ en een voortplantingsstrategie typisch voor de familie Rajidae.
- **Status op de Rode Rijst:** NT - Bijna in gevaar (2006)ⁱⁱⁱ. NT - Bijna in gevaar in Europese wateren (2015)^x.

COMMERCIEEL BELANG

- Klein deel van commerciële visvangsten. Bijvangst bij gemengde sleepnetvisserij^v.
- Aangeland waar de soort veel voorkomt zoals het Bristolkanaal (Groot-Brittannië) en de baai van Bertheaume (Frankrijk)ⁱⁱⁱ.
- Populair onder sportvissers.
- Vanaf 2009 - voor deze soort geldt een vangstquotum in EU-wateren.

HANTEREN EN STEKELPOSITIE


- Voorzichtig hanteren.
- Rij van 50 stekels op de middenlijn.
- Stekels nabij het oog.

REFERENTIES

- Barnes, M. K. S.; 2008. Marine Biological Association.
- Clark, R. S.; 1926. Fishery Board for Scotland.
- Ellis, J. *et al*; 2006. IUCN Red List.
- Fowler, S. L. *et al*; 2005. IUCN SSC Shark Specialist Group.
- Gibson, C *et al*; 2006. IUCN SSC Shark Specialist Group.
- Kaiser, M. J. *et al*; 2004. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, Vol. 60 (3), 445–456.
- Rousset, J; 1987. *Cah. Biol. Mar.* 28 (2): 199-206.
- Shark Trust; 2008.
- Whitehead, P. J. P. *et al*; 1986. UNESCO.
- Nieto, A. *et al*; 2015. European Red List of Marine Fishes.

TANDEN

- 44–52 rijen tanden in de bovenkaak. Tandens stomp, vlak en dicht op elkaar bij vrouwtjes en juvenielen.
- Middelste rijen het scherpst bij mannetjes^{vii}.



EIKAPSEL

- 1 55–99 mm lang (exclusief hoorns).
- 2 35–60 mm breed.
- 3 Lange, draadachtige hoorns en vezelige zomen^{viii}.

Eikapsel lijkt op dat van de Stekelrog, *Raja clavata*. (Eikapsel op ware grootte.)

