

Rugzijde ♀


Buikzijde ♀

## WETENSCHAPPELIJKE NAAM

*Rostroraja alba* (Lacepède, 1803).

## VERSPREIDING

Britse eilanden tot Zuid-Afrika en de Indische Oceaan<sup>v</sup>, ook in westelijke Middellandse Zee<sup>ix</sup>.



## LOKALE NAMEN

**WITTE ROG**, White Skate (UK), Raie Blanche (Fr), Bandroche (De), Raja Bramante (Es), Razza Bianca (It).

## KENMERKEN

- 1 Lange snuit met brede basis<sup>x</sup>.
- 2 Staart iets korter dan lichaam<sup>ii</sup>.
- 3 Rij van ~15 grote stekels op de middenlijn, bereikt zelden de eerste rugvin.
- 4 Aan weerszijden van de staart een rij van stevige stekels.
- 5 Eén stekel tussen rugvinnen<sup>ix</sup>.

## KLEUR

- Rugzijde grijs-blauw bij volwassenen, rood-bruin bij juvenielen.
- patroon van verschillende lichte en donkere vlekken.
- Buik wit met donkere randen<sup>i</sup>.

## BIOLOGIE EN GROOTTE

- Bij geboorte: 29 cm<sup>iv</sup>. Bij geslachtsrijpheid: 130 cm ♀, 120 cm ♂<sup>vii</sup>. Max TL: ~230 cm<sup>x</sup>.
- Voornamelijk een viseter, juvenielen eten ook kreeftachtigen<sup>vi</sup>.
- Broedtijd in eikapsel ~15 maanden<sup>v</sup>.

## GELIJKAARDIGE SOORTEN

- *Dipturus batis*, **Vleet**
- *Dipturus nidarosiensis*, **Noorse Rog**
- *Dipturus oxyrinchus*, **Scherpsnuitrog**

## HABITAT

- Levend op of nabij de bodem, 40–400 m, uitzonderlijk tot 500 m.
- Voorkeur voor zand en los gesteente<sup>v</sup>.

## BESCHERMINGSSTATUS

- Groeit langzaam, laat geslachtsrijp, langlevend en weinig nakomelingen per cyclus. Hierdoor gevoelig voor visserijdruk<sup>v</sup>.
- **Status op de Rode Rijst:** EN - Bedreigd (2006)<sup>v</sup>.  
CR - Ernstig bedreigd in Europese wateren (2015)<sup>xi</sup>.

## COMMERCIEEL BELANG

- In het verleden veel bevestigd, visserij stortte in toen deze soort lokaal uitstierf<sup>iii</sup>.
- Bijvangst van gemengde sleepnetvisserij in de Middellandse Zee en voor de kust van het Iberische Schiereiland<sup>v</sup>.
- Vanaf 2009 - verbod voor commerciële vissers voor het aan boord houden van deze soort in ICES vangstgebieden VI, VII, VIII, IX & X (EU 2015/104).

## HANTEREN EN STEKELPOSITIE


- Voorzichtig hanteren.
- Rij van grote stekels op de middenlijn.
- Rij van stekels aan onderkant van staart.
- Stekel tussen rugvinnen.

## REFERENTIES

- Agustin, L. Q.; 2009. Fishbase.
- Barnes, M. K. S.; 2008. Marine Biological Association.
- Iglésias, S. P. *et al*; 2007. Poster Presentation.
- Clark, R. S.; 1926. Fishery Board for Scotland.
- Dulvy, N. K. *et al*; 2006. IUCN Red List.
- Kyne, P. M. *et al*; 2008. *Journal of Fish Biology*, Vol 72 (1) 61 – 77.
- Serena, F.; 2005. FAO.
- Shark Trust; 2008.
- Whitehead, P. J. P. *et al*; 1986. UNESCO.
- Stehmann, M.; 1995. *Arch. Fish. Mar. Res.*, Vol 43: 1 - 119.
- Nieto, A. *et al*; 2015. European Red List of Marine Fishes.

## TANDEN

- 48 rijen tanden in de bovenkaak.
- Middelste rijen met lange, kegelvormige punten. Andere rijen stomper met korte punten<sup>iv</sup>.



## EIKAPSEL



- 1 Groot, 125–183 mm lang (exclusief hoorns).
  - 2 Vierkante doos, bijna net zo breed als lang.
  - 3 4 lange hoorns en stevige ribbels in de lengte<sup>viii</sup>.
- Eikapsel lijkt op dat van de Blonde Rog, *Raja brachyura*.  
(Ware grootte is 2x deze grootte. Getoond in vergelijking tot een hand van een volwassene.)