

March 25, 1851.

William Yarrell, Esq., Vice-President, in the Chair.

The following papers were read:—

1. CATALOGUE OF THE SPECIES OF *NASSA*, A GENUS OF GASTEROPODOUS MOLLUSCA BELONGING TO THE FAMILY BUCCINIDÆ, IN THE COLLECTION OF HUGH CUMING, ESQ., WITH THE DESCRIPTION OF SOME NEW SPECIES. BY ARTHUR ADAMS, F.L.S. ETC.

Subgenus *NASSA*.

Shell cassiform; spire short; inner lip with the callus greatly developed.

A. Shell ribbed or nodulous.

1. *NASSA ARCULARIA*, Linn.
Bucc. arcularia, Linn.; List. Conch. pl. 970. f. 24; Kien. Bucc. pl. 28. f. 115.
Hab. Mauritius; Philippines, on the reefs (*H. C.*).
2. *NASSA PULLUS*, Linn.
Bucc. pullus, Linn.; Gualtieri, Test. pl. 44. fig. R; Kien. Mon. Bucc. pl. 28. f. 114.
Hab. —?
3. *NASSA CORONATA*, Brug.
Bucc. coronatum, Brug.; Gualtieri, Test. pl. 44. fig. C, D; Kien. pl. 28. f. 112.
Hab. Philippines, on the reefs (*H. C.*).
4. *NASSA MUTABILIS*, Linn.
Bucc. mutabile, Linn.; List. Conch. t. 975. f. 30; Kien. pl. 24. f. 30.
Hab. Red Sea; Philippines, coarse sand, 6 fathoms (*H. C.*).
5. *NASSA MARGINULATA*, Lam.
Bucc. marginulatum, Lam.; Gualtieri, pl. 44. fig. *n*; Kien. Mon. Bucc. pl. 29. f. 117.
Hab. Cagayan, Philippines (*H. C.*).
6. *NASSA TIARULA*, Kien.
Bucc. tiarula, Kien. Mon. Bucc. pl. 30. f. 4.
Hab. Isle of Ticao, Philippines, under stones (*H. C.*).
7. *NASSA POLYGONATA*, Lam.
Bucc. polygonatum, Lam. Voy. de l'Astrol. pl. 32. f. 28, 29.
Hab. Port Jackson, New Holland.

8. *NASSA LUTEOSTOMA*, Kien.
Bucc. luteostoma, Kien. Mon. Bucc. pl. 30. f. 1.
Hab. Coast of Senegal.
9. *NASSA PAUPERATA*, Lam.
Bucc. pauperatum, Lam.; Gualtieri, pl. 44. fig. *m*.
Hab. Signet Bay, North Australia (*Mr. Dring*).
10. *NASSA LIVESCENS*, Phil.
Bucc. livescens, Phil. Zeit. f. Malac. 1848, p. 135.
Hab. Philippines (*H. C.*).
11. *NASSA CANDENS*, Hinds.
Nassa candens, Hinds, Voy. Sulph. Zool. Moll. pl. f.
Hab. Marquesas Islands.
12. *NASSA GEMMULATA*, Lam.
Bucc. gemmulatum, Lam.; Petiver, Amb. pl. 64. f. 7; Kien. Mon.
 Bucc. pl. 22. f. 84.
Hab. Indian Seas.
13. *NASSA ANTILLARUM*, Phil.
Bucc. antillarum, Phil. Zeit. f. Malac. 1848, p. 139.
Hab. West Indies.
14. *NASSA STURMII*, Phil.
Bucc. Sturmii, Phil. Zeit. f. Malac. 1848, p. 135.
Hab. Philippines (*H. C.*).
15. *NASSA NODIFERA*, Phil.
Bucc. nodiferum, Phil. Zeit. f. Malac. 1848, p. 136.
Hab. Island of Ticao, Philippines (*H. C.*).
16. *NASSA MÆSTA*, Hinds.
Nassa mæsta, Hinds, Moll. Zool. Sulph. pl. f.
Hab. Central America.
17. *NASSA LYRILLA*, Beck.
Nassa Lyrilla, Beck.
Hab. East Indies.
18. *NASSA ISABELLEI*, d'Orb.
Bucc. Isabellei, d'Orb. Voy. Amér. Mérid. t. 61. f. 19.
Hab. Central America.
19. *NASSA CREMATA*, Hinds.
Nassa cremata, Hinds, Zool. Voy. Sulph. pl. 9. f. 8, 9.
Hab. Philippines.
20. *NASSA VENUSTA*, Dunker.
Bucc. venustum, Dunker; Phil. Abild. t. 2. f. 1.
Hab. Corrigidor Island, 6 fathoms, coarse sand (*H. C.*). Mus. Cum.

21. *NASSA GRUNERI*, Dunker.
Bucc. Gruneri, Dunker; Phil. Abild. (Buccinum) t. 2. f. 2.
Hab. Island of Ticao. Mus. Cuming.
22. *NASSA CRASSA*, Koch; Phil. Abild. (Buccinum) t. 2. f. 4.
Bucc. crassum, Koch.
Hab. Swan River; Philippines. Mus. Cuming.
23. *NASSA MARGARITIFERA*, Dunker.
Bucc. margaritifera, Dunker; Phil. Abild. (Buccinum) t. 2. f. 12.
Hab. —?
24. *NASSA CAPERATA*, Philippi.
Bucc. caperatum, Phil. Abild. t. 2. f. 18.
Hab. Philippines.
25. *NASSA JONASI*, Dunker.
Bucc. Jonasi, Dunker; Phil. Abild. (Buccinum) t. 2. f. 10.
Hab. —?
26. *NASSA GEMMA*, Philippi.
Bucc. gemma, Phil. Abild. (Buccinum) t. 1. f. 5.
Hab. Island of Ticao, under stones, low water. Mus. Cuming.
27. *NASSA SEMIGRANOSA*, Dunker.
Bucc. semigranosum, Dunker; Phil. Abild. t. 1. f. 9 (Buccinum).
Hab. —?
28. *NASSA ALBESCENS*, Dunker.
Bucc. albescens, Dunker; Phil. Abild. (Buccinum) t. 2. f. 15.
Hab. —?
29. *NASSA SPLENDIDULA*, Dunker.
Bucc. splendidulum, Dunker; Phil. Abild. t. 3. f. 13.
Hab. —?
30. *NASSA CORONULA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, cinerescente, fasciá supra albidá, infra fusco ornatá; spirá brevi; anfractibus ad suturas angulatis, longitudinaliter costatis, costis distantibus rotundis supra nodulosis; labio callo crasso obtecto; columellá rugosá; labro extus marginato, intus lirato.*
Hab. Corrigidor, Bay of Manila, under stones, low water (H. C.).
Mus. Cuming.
31. *NASSA DISPAR*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, ventricosá, lævi, lutescente, rufo cinereoque varie pictá; anfractibus supernè gibbosis; labio callo albo mediocri tecto; columellá transversim corrugatá; labro anticè dentato, intus lirato.*
Hab. Philippines, sandy mud (H. C.). Mus. Cuming.
32. *NASSA STIGMARIA*, A. Adams. *N. testá ovato-ventricosá, rufescente, albo fuscoque variegatá et punctatá; liris granosis*

transversis ornatá, granis planis quadratis; labio lævi, callo albo nitido oblecto, labro margine dentato.

Hab. Island of Siquijor, Philippines, under stones (*H. C.*). Mus. Cuming.

33. *NASSA SIQUIJORENSIS*, A. Adams. *N. testá ovatá, subturritá, rufescente, fasciá pallidá cinctá, longitudinaliter costellatá; suturá tuberculis moniliformibus ornatá, costellis permultis confertis, interstitiis transversim striatis; columellá corrugatá, labro anticè valdè dentato.*

Hab. Island of Siquijor, Philippines (*H. C.*). Mus. Cuming.

34. *NASSA RETECOSA*, A. Adams. *N. testá ovatá, acuminatá; spirá acutá, rufescente, suturá canaliculatá, cingulis albis transversim et longitudinaliter cancellatá; labro crenato, anticè dilatato et sinuato; labio callo, subexpanso, anticè recto.*

Hab. Albay, Luzon, coarse sand, 6 fathoms (*H. C.*). Mus. Cum.

35. *NASSA VERRUCOSA*, A. Adams. *N. testá ovato-acuminatá, spirá productá; suturá canaliculatá, rufescente, fusco sparsim punctatá, liris transversis granosis ornatá, granis rotundis verruciformibus in seriebus obliquis longitudinalibus dispositis; labio valdè calloso, tuberculato, albo; labro margine serrato.*

Hab. Eastern Seas.

36. *NASSA VARIEGATA*, A. Adams. *N. testá ovato-ventricosá, albido-grisèd, fuscoque variegatá, longitudinaliter striatá, liris transversis granosis subdistantibus ornatá, granis rotundis in seriebus obliquis longitudinalibus dispositis; labio tuberculato callo tenui expanso tecto, labro margine crenato.*

Hab. Dalmaguete, island of Negros, Philippines (*H. C.*). Mus. Cuming.

37. *NASSA CÆLATA*, A. Adams. *N. testá ovatá, acuminatá, subturritá, albidá, fasciá rufá cinctá, suturá tuberculis moniliformibus ornatá, longitudinaliter costellatá; costellis simplicibus, interstitiis concinnè clathratis, labio callo tenui oblecto, labro margine crenulato.*

Hab. Cagayan, Mindanao, sandy mud, 25 fathoms (*H. C.*). Mus. Cuming.

38. *NASSA RANIDA*, A. Adams. *N. testá ovatá, acuminatá, subturritá, rufescente, cingulis transversis granosis sculptá, granis elongatis subquadratis in seriebus obliquis longitudinalibus dispositis; columellá rugosá; labio non calloso, labro valdè dentato.*

Hab. Burias, 6 fathoms, coral sand (*H. C.*). Mus. Cuming.

39. *NASSA SORDIDA*, A. Adams. *N. testá ovatá, albidá, fusco fasciatá; suturá tuberculis moniliformibus ornatá; longitudinaliter costatá, transversim valdè liratá; labio callo albo crasso tecto; columellá corrugatá; labro margine calloso reflexo.*

Hab. Siquijor, on the reefs.

40. *NASSA CUMINGII*, A. Adams. *N. testá ovatá, ventricosá albidá, rufo nebulosá; suturá canaliculatá, liris transversis granosis sculptá, granis quadratis in seriebus longitudinalibus dispositis; aperturá ringente; labio corrugato, tuberculifero; labro intus valde sulcato.*
Hab. China. Mus. Cuming. Unique specimen.
41. *NASSA CRENELLIFERA*, A. Adams. *N. testá ovatá, acuminatá, subturritá, albidá, fasciá pallidá rufá cinctá; suturá canaliculatá, margine crenellifero, transversim striatá, longitudinaliter tenuissimè costatá; columellá sublævi; labro integro.*
Hab. — ? Mus. Cuming.
42. *NASSA SULCIFERA*, A. Adams. *N. testá ovato-ventricosá; spirá productá, cinerescente, luteo-fusco variegatá, longitudinaliter subplicatá, transversim liratá; anfractu ultimo infra suturam sulco impresso; labii callo crasso mediocri; collumellá anticè biplicatá; labro intus lirato.*
Hab. Algoa Bay.
43. *NASSA CORTICATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, spirá productá, epidermide viridi-fusco obtectá; anfractibus supernè nodosis; anfractu ultimo anticè cingulá subnodosá ornato, posticè nodulis coronato; labio vix calloso; columellá anticè biplicatá; labro extus marginato, intus lirato.*
Hab. New Zealand.
44. *NASSA LABECULA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, obliquá; spirá subacuminatá, pallidè fuscá; anfractu ultimo fasciá fuscá obsoletá cincto; anfractibus planulatis supremis costatis, ultimo supernè costato, infernè plano; labii callo expanso, tenui, nitidá labeculá fuscá ornato; labro posticè incrassato, intus dentato.*
Hab. Burias, 6 fathoms, coral sand (H. C.). Mus. Cuming.
45. *NASSA MULTICOSTATA*, A. Adams. *N. testá ovatá, acuminatá, albo rufoque variegatá, longitudinaliter costatá; costis planis obliquis confertis permultis; labio cum callo parvo tecto; columellá lævi, anticè biplicatá; labro intus sulcato, margine acuto integro.*
Hab. Batangas, island of Luzon, 4 fathoms, coarse sand (H. C.).
 Mus. Cuming.
46. *NASSA COSTATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, spirá acutá, productá, pallidá, anfractu ultimo maculá rufo-fuscá ornata; anfractibus convexiusculis, longitudinaliter costatis, interstitiis planis; anfractu ultimo anticè transversim striato; labio cum callo circumscripto tecto; columellá transversim rugosá; labro anticè dentato, intus lirato.*
Hab. Island of Burias, sandy mud, 6 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.
47. *NASSA CALLOSA*, A. Adams. *N. testá parvâ, ovatâ, spirâ acutâ, albâ fusco-maculatâ, longitudinaliter costatâ, transversim sulcatâ; labio cum callo magno albo nitido expanso tecto; columellâ*

anticè triplicatá; labro margine incrassato calloso, intus dentato-lirato.

Hab. Bais, island of Negros, 7 fathoms, sandy mud (*H. C.*). Mus. Cuming.

48. *NASSA GEMMULIFERA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, spirá acutá, productá, cinerescente rufo variegatá, longitudinaliter plicatá, transversim cingulatá, cingulis ad plicas noduliferis; labio cum callo expanso albo tecto; columellá transversim corrugatá; labro intus lirato.*

Hab. Burias, 6 fathoms, coarse sand (*H. C.*). Mus. Cuming.

49. *NASSA FISSILABRIS*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, obliquá, cinerescente, pallidè fasciatá, longitudinaliter costatá, anfractu ultimo anticè transversim sulcato; labio cum callo expanso obtecto; columellá anticè tuberculis duobus transversis; labro anticè sinuato, posticè valde inciso.*

Hab. Cagayan, Prov. Misamis, island of Mindanao, 25 fathoms, sandy mud (*H. C.*). Mus. Cuming.

50. *NASSA NODICOSTATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, albá, fasciá pallidá fulvá cinctá; anfractibus planulatis, longitudinaliter costatis, transversim evanide liratis; costis nodis distantibus instructis, supernè nodosis; labio cum callo circumscripto tecto; columellá rugosá, anticè acutá, productá; labro extus limbato, anticè valde sinuato.*

Hab. Island of Corrigidor, 6 fathoms, coarse sand (*H. C.*). Mus. Cuming.

51. *NASSA DELICATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, subpellucidá, albidá, fasciá angustá, fuscá, maculisque fuscis ornatá, longitudinaliter costatá, costis planulatis supernè nodosis, interstitiis lineis elevatis transversis clathratis; labio calloso; columellá anticè plicis quatuor; labro margine acuto, intus longitudinaliter sulcato, transversim lirato.*

Hab. Sorsogon, Albay, Luzon, coarse sand, 6 fathoms (*H. C.*). Mus. Cuming.

52. *NASSA CANCELLATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, spirá acutá, fulvescenti, fusco variegatá, longitudinaliter costatá, costis planis rotundatis, interstitiis concinnè cancellatis; labio callo magno expanso crasso obtecto; columellá lævi, simplici; labro margine calloso incrassato, anticè subsinuato.*

Hab. Masbate, under stones (*H. C.*). Mus. Cuming.

53. *NASSA CLATHRATULA*, A. Adams. *N. testá ovatá, spirá acutá, anfractibus convexis, nived, longitudinaliter costatá; costis nodulosis, interstitiis valde clathratis; labio cum callo mediocri obtecto; columellá anticè biplicatá; labro extus varicoso, intus lirato.*

Hab. Island of Siquijor, deep water, sandy mud (*H. C.*). Mus. Cuming.

54. *NASSA CRENOLIRATA*, A. Adams. *N. testá parvá, ovatá, pallidá, lineis angustis transversis fuscis ornatá, longitudinaliter costatá, costis nodulosis, supernè nodosis; aperturá angustatá; labio cum callo obtecto; columellá plicis quatuor transversis instructo; labro extus marginato, intus valde dentato-lirato.*

Hab. —? Mus. Cuming.

55. *NASSA SINUSIGERA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, obliquá; spirá acuminatá, pallidá, fusco variegatá, longitudinaliter costatá, costis supernè nodulosis, transversim sulcatá; labio cum callo mediocri tecto; columellá transversim corrugato-plicatá; labro anticè valde sinuato.*

Hab. Catbalonga, island of Samaar, 8 fathoms, coarse sand (H. C.). Mus. Cuming.

56. *NASSA GENICULATA*, A. Adams. *N. testá parvá, ovato-conicá, fulvá, albo variegatá; fasciá latá, transversá, cinereo-fuscá cinctá, transversim striatá, longitudinaliter costatá; costis geniculatis; labio subcalloso, anticè bituberculato; labro extus incrassato, intus dentato-lirato.*

Hab. Island of Ticao, 4 fathoms, sand (H. C.). Mus. Cuming.

57. *NASSA SPECIOSA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, acuminatá, lutescente, albo variegatá, transversim lirátá, liris confertis granulosis, longitudinaliter plicatá; plicis distantibus obliquis, supernè nodosis, nodulis albis; aperturá albá, anticè rufo-fusco maculatá; columellá lævi, callo subexpanso tectá; labro intus evanidè lirato, margine anticè maculá fuscá.*

Hab. —? Mus. Cuming.

58. *NASSA OBTUSATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, spirá obtusá, pallidá, rufo-fusco variegatá, transversim lirátá, longitudinaliter costatá, costis distantibus supernè nodosis; labio callo crasso albo obtecto; labro intus incrassato, sulcato et transversim lirato.*

Hab. Island of Ticao, coral sand, 7 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.

59. *NASSA ABYSSICOLA*, A. Adams. *N. testá parvá, ovato-conicá, sordidè albá; costellis confertis longitudinalibus permultis, interstitiis concinnè clathratis ornatá; labio arcuato, mediocriter calloso; labro intus dentato-lirato, extus incrassato.*

Hab. Loay, island of Bohol, clayey ground, 60 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.

60. *NASSA PUSIO*, A. Adams. *N. testá parvá, ovato-conicá, fulvá, fusco variegatá et maculosá; costellis planis, longitudinalibus confertis ornatá; anfractu ultimo anticè sulcato, labio cum callo nitido subexpanso tecto; labro intus sulcato, margine subreflexo.*

Hab. Sorsogon, Albay, isle of Luzon, 6 fathoms, coarse sand (H. C.). Mus. Cuming.

B. Shell spinulose ; inner lip with the callus moderate, defined.

61. *NASSA SUBSPINOSA*, Lam.

Bucc. subspinosum, Lam. ; Kien. Mon. Bucc. pl. 26. f. 103.

Hab. Gindulman, island of Bohol, Philippines, low water (*H. C.*).

62. *NASSA MURICATA*, Quoy et Gaim.

Bucc. muricatum, Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 32. f. 32, 33.

Hab. Puerto Galero, island of Mindoro (*H. C.*).

63. *NASSA VIBEX*, Say.

Bucc. vibex, Say.

Hab. West Indies, Philippines.

64. *NASSA AMBIGUA*, Montag.

Bucc. ambiguum, Mont. ; Kien. Bucc. Mon. pl. 21. f. 81.

Hab. British Islands.

65. *NASSA HORRIDA*, Dunker.

Bucc. horridum, Dunker ; Phil. Abild. t. 2. f. 8.—*Bucc. scabrum*, Dunker, olim.

Hab. Eastern Seas.

66. *NASSA HISPIDA*, A. Adams. *N. testá ovato-acutá, albido-cinerea, rufo-fusco punctatá, nodispinosa, longitudinaliter plicatá ; plicis cum seriebus novem tuberculorum spiniformium armatis.*

Hab. Loon, island of Bohol, on the reefs, low water (*H. C.*).
Mus. Cuming.

Plicated, the rows of tubercles rather close together, the upper row distinct from the rest.

67. *NASSA ECHINATA*, A. Adams. *N. testá elongato-ovatá, albidá, nodispinosa, longitudinaliter plicatá, plicis quinque, seriebus tuberculorum spiniformium armatis.*

Hab. Galeo, island of Mindoro, 3 fathoms, sandy mud (*H. C.*).

Plicated, with the upper row of tubercles larger and distinct from the others.

Subgenus *EIONE*, Risso.

Shell with the back gibbous ; inner lip with the callus greatly developed, surrounding the circumference of the shell.

1. *EIONE GIBBOSULA*, Linn.

Bucc. gibbosulum, Linn. ; List. Conch. t. 973. f. 28 ; Kien. Mon. Bucc. pl. 28. f. 116.

Hab. — ?

2. *EIONE CLATHRATA*, Kien.

Bucc. clathratum, Kien. Mon. Bucc. pl. 27. f. 108.

Hab. — ?

3. *EIONE GRANIFERA*, Kien.

Bucc. graniferum, Kien. Mon. Bucc. pl. 27. f. 111.

Hab. — ?

4. EIONE THERSITES, Brug.

Bucc. Thersites, Brug.; List. Conch. t. 971. f. 26; Kien. Mon. Bucc. pl. 28. f. 113.

Hab. — ?

5. NASSA CIRCUMCINCTA, A. Adams. *N. testá ovatá, cineré, nitidá, dorso gibbosá; spirá brevi, acutá, suturá fuscá; labio cum callo crasso albo nitido tecto, marginibus usque ad spiram decurrentibus fusco marginatis; columellá lævi, anticè uniplicatá; labro calloso marginato, intus lævi.*

Hab. Red Sea. Mus. Cuming.

6. NASSA DORSUOSA, A. Adams. *N. testá ovatá, depressá; spirá acutá, dorso in medio nodatá, olivacé, lævi, longitudinaliter subplicatá; labio cum callo magno crasso lutescente tecto, marginibus incrassatis usque ad spiram decurrentibus; columellá lævi, labro margine calloso incrassato, intus sublirato.*

Hab. Masbate, on the mud-banks at low water (H. C.). Mus. Cuming.

7. NASSA ORBICULATA, A. Adams. *N. testá semiorbiculari, convexo-depressá, lævi, olivacé, apud dorsum gibbá; spirá brevi, labio cum callo expanso crasso tecto, marginibus usque ad spiram decurrentibus, columellá lævi, labro extus calloso incrassato.*

Hab. — ? Mus. Cuming.

8. NASSA CALLOSPIRA, A. Adams. *N. testá ovatá, pallidá, fasciá transversá cineré ornatá; spirá acutá, transversim liratá, plicis nodosis longitudinalibus instructá; labio cum callo magno albo extenso tecto, marginibus usque ad spiram decurrentibus; columellá anticè biplicatá; labro crasso calloso, marginato, intus valde lirato.*

Hab. Island of Burias, 6 fathoms, coral sand (H. C.). Mus. Cuming.

9. NASSA NANA, A. Adams. *N. testá ovatá, spirá acutá; anfractibus rotundatis, rufescente, fasciá pallidá luteá ornatá, longitudinaliter plicatá, transversim semistriatá; labio cum callo expanso tenui tecto; columellá rugosulá; labro marginato, intus sulcato.*

Hab. Dumaguete, island of Negros, coarse black sand, 11 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.

10. NASSA BELLULA, A. Adams. *N. testá ovatá, spirá acuminatá, acutá; anfractibus angulatis, pallidulá, fasciá luteolá ornatá, longitudinaliter plicatá, transversim liratá; interstitiis concinnè longitudinaliter striatis, labio callo magno tecto; columellá rugosá; labri margine rugoso calloso, intus crenulato.*

Hab. Catbalonga, island of Samaar, under stones, low water. Mus. Cuming.

11. NASSA BIMACULOSA, A. Adams. *N. testá suborbiculari, apud dorsum valde convexá, nodosá; spirá acutá, longitudinaliter sub-*

plicatá, anticè transversim sulcatá, olivaceá, fasciá pallidá transversá cinctá, labio cum callo crasso albo magno suborbiculari cincto; columellá lævi, anticè uniplicatá; labro valde incrassato marginato, anticè sinuato, intus lirato, extus maculis duabus rufofuscis ornato.

Hab. Island of Siquijor, on mud-banks (*H. C.*). Mus. Cuming.

12. *NASSA LEPTOSPIRA*, A. Adams. *N. testá ovatá, apud dorsum convexá, nodosá; spirá productá, acutá, lutescente longitudinaliter plicatá, anticè transversim striatá, labio cum callo luteo crasso tecto; columellá corrugatá, labro intus lirato.*

Hab. Ilo Ilo, island of Panay, on mud-banks, low water (*H. C.*). Mus. Cuming.

Subgenus ALECTRION, Montfort.

Shell bucciniform; spire elevated; inner lip with the callus moderately developed; outer lip dentate, or serrate at the margin.

A. Shell papillose; inner lip spread.

1. *NASSA PAPILOSA*, Linn.

Bucc. papillosum, Linn.; List. Conch. t. 969. f. 23.

Hab. Island of Capul, on the reefs (*H. C.*).

2. *NASSA NASSOIDES*, Reeve.

Bucc. nassoides, Reeve, Conch. Icon. Mon. Buccinum, pl. f.

Hab. —?

3. *NASSA NODIFERA*, Powis.

Nassa nodifera, Powis.

Hab. Philippines.

4. *NASSA MONILIS*, Kien.

Bucc. monile, Kien. Mon. Bucc. pl. 11. f. 40.

Hab. New Guinea.

5. *NASSA CRENULATA*, Brug.

Bucc. crenulatum, Brug.; Petiver, Gaz. t. 64. f. 8; Kien. Mon. pl. 23. f. 90, pl. 14. f. 49.

Hab. Indian Seas.

6. *NASSA HIRTA*, Kiener.

Bucc. hirtum, Kien. Mon. Bucc. pl. 19. f. 72.

Hab. New Holland.

7. *NASSA JACKSONIANA*, Kiener.

Bucc. Jacksonianum, Kien. Mon. Bucc. pl. 19. f. 73.

Hab. Port Jackson, New Holland.

8. *NASSA VARIABILIS*, Phil.

Bucc. variabile, Phil. En. Moll. Sicil. vol. i. p. 221.—*B. subdiaphanum*, Bivon.—*B. stolatum*, Gmel.—*B. zonale*, Brug.—*B. costu-*

latum, Brocc.—*B. angulatum*, Brocc.—*B. Cuvieri*, Payr.—*B. Ferussacii*, Payr.—*B. corrugatum*, Brocc.

Hab. Mediterranean.

9. *NASSA COMPLANATA*, Powis.

Nassa complanata, Powis.

Hab. Atacamas, West Columbia.

10. *NASSA SEMINODOSA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, acuminatá, lævi, nitidá, fulvo-fuscescente; suturá tuberculis moniliformibus ornatá; longitudinaliter plicatá, plicis supernè subnodulosis; anfractu ultimo anticè transversim sulcato, labio lævi, cum callo tenui expanso obtecto, labro anticè dentato intus lirato.*

Hab. Island of Annaa, South Seas, on the reefs (*H. C.*). Mus. Cuming.

B. Shell smooth, polished.

1. *NASSA GLANS*, Linn.

Bucc. glans, Linn.; List. Conch. t. 981. f. 40; Kien. Mon. pl. 15. f. 52.

Hab. Island of Ticao, Philippines, on the reefs (*H. C.*).

2. *NASSA SUTURALIS*, Lam.

Bucc. suturale, Lam. Chem. pl. 125. f. 1199, 1200; Kien. Mon. pl. 24. f. 96.

Hab. Swan River.

3. *NASSA ELEGANS*, Kien.

Bucc. elegans, Kien. Mon. Bucc. pl. 24. f. 97.

Hab. Indian Ocean.

4. *NASSA RUFULA*, Kien.

Bucc. rufulum, Kien. Mon. Bucc. pl. 24. f. 95.

Hab. Swan River.

5. *NASSA LÆTA*, Philippi.

Bucc. lætum, Phil. Zeit. f. Mal. 1848, p. 141.

Hab. —?

6. *NASSA BRONNII*, Philippi.

Bucc. Bronnii, Phil. Zeit. f. Malac. 1848, p. 137.

Hab. Corrigidor, 6 fathoms, coarse sand (*H. C.*).

7. *NASSA GAUDIOSA*, Hinds.

Nassa gaudiosa, Hinds, Moll. Voy. Sulph. pl. . . f. . .

Hab. Straits of Malacca.

8. *NASSA PICTA*, Dunker.

Buccinum pictum, Dunker, Phil. Abild. (Buccinum), t. 2. f. 6.

Hab. Philippines. Mus. Cuming.

9. *NASSA REEVIANA*, Dunker.

Buccinum Reevianum, Dunker, Phil. Abild. (Buccinum), t. 2. f. 3.

Nassa filosa, Gray MSS.

Hab. Philippines. Mus. Cuming.

10. *NASSA MUCRONATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, sublævi, nitidá, longitudinaliter plicatá, lutescenti fusco variegatá; anfractibus rotundatis, ultimo gibboso; spirá acutá, mucronatá; labio lævi; labro intus lirato.*

Hab. Dumaguete, isle of Negros, 11 fathoms, black sand (H. C.). Mus. Cuming.

11. *NASSA OBLIQUATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, obliquá, lævissimá, nitidá; lineis fuscis transversis, fasciá pallidá ornatá, cinerescente, albo variegatá; labio lævi, simplici; labro intus lirato.*

Hab. Cagayan, province of Misamis, island of Mindanao, sandy mud, 25 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.

12. *NASSA PUNCTATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá; spirá acuminatá, lævi, cinereá, albido punctatá, lineolis fuscis transversis ornatá; labio callo tenui expanso tecto; columellá rugosá; labro extus incrassato, intus lirato.*

Hab. Puerto Galero, province of Albay, isle of Luzon, coarse sand, 6 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.

13. *NASSA LENTIGINOSA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá; spirá acuminatá, lævi, nitidá, lutescente aut cinerescente, lineis undulatis confertis pictá, lineolis fuscis transversis ornatá; labio cum callo tenui tecto; columellá anticè rugosá; labro margine incrassato, intus valde lirato.*

Hab. Masbate, 7 fathoms, sandy mud (H. C.). Mus. Cuming.

14. *NASSA LUCTUOSA*, A. Adams. *N. testá ovatá, elongatá, acuminatá, subnitidá, transversim sulcatá, nigricante nonnunquam fasciis albo-articulatis ornatá; anfractibus planulatis; labio callo nitido obtecto; columellá anticè biplicatá et tuberculis tribus instructá; labro extus incrassato, intus valde lirato.*

Hab. Cagayan, province of Misamis, isle of Mindanao, under stones on the reefs (H. C.). Mus. Cuming.

15. *NASSA STOLIDA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá; spirá acuminatá, solidá, cinereá, fusco maculatá, longitudinaliter plicatá; aperturá anticè effusá; labio reflexo, lævi, valde calloso; labro intus lævi, fusco alboque fasciato.*

Hab. —? Mus. Cuming.

16. *NASSA DISTORTA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, nitidá; spirá acuminatá, distortá, pallidá, cinereo variegatá, lineis fuscis transversis ornatá; aperturá anticè valde effusá; labio lævi, anticè biplicato; labro anticè producto, intus lirato.*

Hab. —? Mus. Cuming.

17. *NASSA MARMOREA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, lævi, nitidá; spirá subacuminatá, albidá, fusco marmoratá, fasciis duabus pallidis ornatá; anfractibus planiusculis; labio corrugato; labro extus varicoso, intus lirato.*

Hab. Cagayan, Mindanao, 25 fathoms, sandy mud (H. C.). Mus. Cuming.

18. *NASSA SPIRATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, acuminatá, lævi, nitidá, albidá, luteo-fusco nebulosá; anfractibus convexiusculis, prope suturas angulatis; labio lævi; labro intus lirato, extus incrassato, anticè margine simplici non dentato.*

Hab. Swan River. Mus. Cuming.

C. Shell smooth or ribbed. Inner lip defined.

1. *NASSA OLIVACEA*, Brug.

Bucc. olivaceum, Brug. Favanne Conch. pl. 33. f. 2; Kien. Mon. Bucc. pl. 15. f. 53.

Hab. Philippines.

2. *NASSA CANALICULATA*, Lamarck.

Bucc. canaliculatum, Lam. Chem. Conch. pl. 125. f. 1194-95; Kien. Mon. Bucc. pl. 23. f. 89.

Hab. Philippines.

3. *NASSA UNICOLOR*, Kiener.

Bucc. unicolor, Kien. Mon. Bucc. pl. 19. f. 69.

Hab. Australia.

4. *NASSA ORNATA*, Kiener.

Bucc. ornatum, Kiener, Mon. Bucc. pl. 124. f. 168.

Hab. Tranquebar, Ceylon, Indian Seas.

5. *NASSA EXILIS*, Powis.

Nassa exilis, Powis.

Hab. — ?

6. *NASSA RUFOCINCTA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, sub-turritá, albidá, fasciá transversá rufá ornatá, longitudinaliter plicatá, transversim striatá; anfractibus subrotundatis; labio callo albo circumscripto tecto; labro extus marginato, intus sulcato.*

Hab. Honduras (Dyson). Mus. Cuming.

7. *NASSA MICANS*, A. Adams. *N. testá ovato-fusiforimi, albidá, lævi, nitidissimá; anfractibus convexiusculis supremis costellatis; labio callo tenui tecto; labro anticè crenulato, intus lirato.*

Hab. Cagayan, Misamis, Mindanao, 25 fathoms, sandy mud (H. C.). Mus. Cuming.

8. *NASSA PALLIDULA*, A. Adams. *N. testá ovatá, subacuminatá, pallidá, lævi, anfractu ultimo anticè transversim sulcato; suturá*

canaliculatá; labio cum callo circumscripto tecto; columellá simplici; labro extus marginato, intus lirato.

Hab. Malacca, coarse sand, 10 fathoms (H. C.).

9. *NASSA COMPTA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, subturritá, lævi, nitidá, rufescente pallidè variegatá; anfractibus convexiusculis, supremis costellatis; labio cum callo circumscripto tecto; columellá anticè corrugatá; labro margine incrassato, albo, subreflexo.*

Hab. Cape St. Antonio, Africa.

10. *NASSA SUCCINCTA*, A. Adams. *N. testá ovatá, subturritá, lævi, cinerescente; fasciá pallidá, cinctá, anfractibus planulatis, supremis costellatis; suturá subcanaliculatá; labio cum callo incrassato circumscripto tecto; columellá dentato-rugosá; labro posticè inflexo, anticè valde sinuato et dentato, extus limbato, intus lirato.*

Hab. Masbate. Mus. Cuming.

11. *NASSA ZONALIS*, A. Adams. *N. testá ovato-acuminatá, lævi, nitidá, longitudinaliter striatá; anfractu ultimo transversim sulcato; lutescente, fasciis tribus transversis rufo-fuscis cinctá; labio cum callo tenui expanso tecto; columellá lævi; labro extus incrassato, intus lirato.*

Hab. Isle of Ticao, on the reefs (H. C.). Mus. Cuming.

12. *NASSA SERTULA*, A. Adams. *N. testá ovatá, acuminatá, lævi, nitidá, fulvá, albo nebulosá; anfractibus convexiusculis, supremis costellatis; labio cum callo circumscripto tecto; columellá transversim corrugatá; labro extus incrassato, intus lirato.*

Hab. Masbate, on the reefs (H. C.). Mus. Cuming.

13. *NASSA SEMIPLICATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, cinerea, fasciá pallidá transversá ornatá, nitidá, sublævi, longitudinaliter plicatá, plicis in anfractu ultimo sæpè evanidis, interstitiis transversim striatis; labio callo circumscripto; columellá transversim corrugato-plicatá; labro extus albo marginato, intus lirato.*

Hab. Chusan (Benson). Mus. Cuming.

14. *NASSA CINNAMOMEA*, A. Adams. *N. testá ovato-acuminatá, cinnamomeá, lævi, nitidá, lævigatá, sempellucidá, anfractibus convexis; labio simplici; labro extus marginato, intus sublirato.*

Hab. Dumaguete, isle of Negros, under stones, low water (H. C.).
Mus. Cuming.

15. *NASSA BADIA*, A. Adams. *N. testá ovato-acuminatá, lævi, nitidá, castaneá; anfractibus planis, supremis longitudinaliter plicatis, anfractu ultimo transversim striato; labio simplici via calloso; labro extus marginato, intus plicato.*

Hab. Sinaat, province of North Ilocos, island of Luzon, on the reefs (H. C.). Mus. Cuming.

16. *NASSA MITRALIS*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, acuminatá, fuscá, sublævi, longitudinaliter semiplicatá; anfractibus planiusculis, ultimo anticè transversim sulcato; labio subcorrugato; labro extus marginato, intus valde lirato.*
Hab. Isinimalan, isle of Negros, on the mud-banks (H. C.). Mus. Cuming.
17. *NASSA SEROTINA*, A. Adams. *N. testá turritá, acuminatá, serotiná, anfractu ultimo anticè cingulis duabus elevatis articulatis ornato; transversim substriatá, longitudinaliter plicatá, plicis rotundis subdistantibus; aperturá albá; columellá lævi, subcallosá; labro extus incrassato, intus lirato.*
Hab. Australia.
18. *NASSA PULCHELLA*, A. Adams. *N. testá turritá, acuminatá, nitidá, albidá, luteo variegatá, fasciá fuscá transversá ornata; longitudinaliter plicatá, plicis subdistantibus rotundatis tuberculis albis transversis instructis; labio calloso nitido; labro extus marginato, intus lirato.*
Hab. Cape of Good Hope. Mus. Cuming.
19. *NASSA TERETIUSCULA*, A. Adams. *N. testá subturritá, acuminatá, lutescente aut plumbeá, fasciá angustá fuscá transversá ornata; lævi, nitidá, longitudinaliter valde plicatá; labio cum callo mediocri tecto; columellá anticè tortuosá, plicatá; labro extus limbato, intus lirato.*
Hab. Eastern Seas. Mus. Cuming.
20. *NASSA VARICIFERA*, A. Adams. *N. testá turritá; spirá acuminatá, pallidá, fasciis fuscis duabus transversis ornata; anfractibus subplanulatis, varicibus albis, spiraliter instructis; suturá canaliculatá; columellá anticè plicis tribus transversis; labro extus marginato, posticè angulato, intus valde lirato.*
Hab. Eastern Seas.
21. *NASSA SCALARIS*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, subturritá, pallidá, rufo-fusco fasciatá; longitudinaliter costatá, transversim lirata; anfractibus rotundatis, tuberculis moniliformibus apud suturam; suturá subcanaliculatá; labio cum callo subexpanso tenui tecto; columellá corrugatá, anticè biplicatá; labro anticè crenulato, intus lirato.*
Hab. Island of Corrigidor, 7 fathoms, coarse sand (H. C.). Mus. Cuming.
22. *NASSA PLANOCOSTATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, cinerescente, fasciá rufo-fuscá transversim cinctá; costellis planis confertis longitudinalibus, interstitiis concinnè clathratis ornata; labio cum callo circumscripto tecto; columellá transversim plicatodentatá; labio anticè denticulato, intus valde lirato.*
Hab. Payta, Peru, under stones, low water (H. C.). Mus. Cuming.

D. Shell scalariform, cancellated.

1. *NASSA SCALARIFORMIS*, Valenc.
Buccinum scalariforme, Val. ; Kiener, Monograph Bucc. pl. 21. f. 80.
Hab. New Guinea.
2. *NASSA ROISSYI*, Deshayes.
Bucc. Roissyi, Belang. Voy. aux Ind. Or. pl. 3. f. 3, 4 ; Kiener, Mon. Bucc. pl. 21. f. 82.
Hab. Indian Ocean.
3. *NASSA REEVEI*, A. Adams.
Bucc. elegans, Reeve.
Hab. — ?
4. *NASSA NUCLEOLUS*, Philippi.
Bucc. nucleolus, Philippi.
Hab. — ?
5. *NASSA NODATA*, Hinds.
Nassa nodata, Hinds, Moll. Voy. Sulphur, pl. . f. .
Hab. Malacca.
6. *NASSA PERPINGUIS*, Hinds.
Nassa perpinguis, Hinds, Moll. Voy. Sulphur, pl. . f. .
Hab. Bay of Magdalena, California. Mus. Cuming.
7. *NASSA MIGA*, Adanson.
Bucc. miga, Adanson, Voy. au Senegal, pl. 8. f. 10 ; Kiener, Mon. Bucc. pl. 22. f. 87.
Hab. Senegal. Mus. Cuming.
8. *NASSA MYRISTICATA*, Hinds.
Nassa myristicata, Hinds, Moll. Voy. Sulphur, pl. 9. f. 10, 11.
Hab. Cape of Good Hope.
9. *NASSA PALLIDA*, Powis.
Nassa pallida, Powis.
Hab. Panama, sandy mud, 6 fathoms. Mus. Cuming.
10. *NASSA NODULIFERA*, Philippi.
Buccinum noduliferum, Phil. Abild. (Bucc.) t. 1. f. 3.
11. *NASSA ANGULIFERA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, sub-turritá, pallidè fulvá; fasciá fuscá cinctá, transversim sulcatá, longitudinaliter plicatá, plicis distantibus, posticè apud suturas angulatis; labio cum callo albo nitido tecto; labro margine sub-reflexo, intus crenulato.*
Hab. Galapagos Islands, 10 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.

12. *NASSA NODICINCTA*, A. Adams. *N. testá ovato-turritá; spirá acuminatá, pallidá, lineis rufis transversis cinctá, transversim sulcatá; plicis distantibus longitudinalibus, apud suturas noduliferis ornatá; labio cum callo albo lævi nitido tecto; labro extus varicoso, intus lirato.*
Hab. Galapagos Islands, 7 fathoms (*H. C.*). Mus. Cuming.
13. *NASSA SANCTÆ HELENÆ*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, subturritá; spirá productá; anfractibus rotundatis, albidá rufo-variegatá, longitudinaliter costatá, costis distantibus subnodosis; anfractu ultimo anticè transversim sulcato; labio lævi, calloso; columellá anticè uniplicatá; labro intus lirato.*
Hab. St. Helena, sandy mud, 20 fathoms (*H. C.*). Mus. Cuming.
14. *NASSA CINCTELLA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, albidá, lineis fuscis transversis cinctá, longitudinaliter valde plicatá, plicis distantibus, liris transversis albis, interstitiis fuscis ornatá; labio corrugato, vix calloso; labro extus varicoso, intus valde lirato.*
Hab. St. Helena, 20 fathoms, sandy mud.
15. *NASSA CORRUGATA*, A. Adams. *N. testá elongatá, subturritá, fulvescente, rufo nebulosá; transversim lirata, longitudinaliter plicatá; plicis nodulosis; anfractibus convexiusculis; labio simplici, non calloso; labro intus lirato, margine crenulato; columellá tortuosá, anticè productá.*
Hab. Eastern Seas. Mus. Cuming.
16. *NASSA TURRITA*, A. Adams. *N. testá elongatá, subturritá, pallidè fulvá; anfractibus rotundatis; suturá subcanaliculatá, longitudinaliter plicatá, transversim lirata, liris subnodulosis; labio cum callo tenui tecto; columellá anticè abruptè truncatá; labro intus valde lirato.*
Hab. —? Mus. Cuming.
17. *NASSA JAPONICA*, A. Adams. *N. testá turritá, pallidè fulvá, fasciá rufo-fuscá cinctá; longitudinaliter plicatá, cingulis transversis ad plicas nodulosis ornatá, interstitiis longitudinaliter striatis; labio subrugoso; columellá anticè productá; labro intus lirato.*
Hab. Japan (*Dr. Siebold*). Mus. Cuming.
18. *NASSA DENTICULATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, fulvescente rufo maculosá; anfractibus convexiusculis, longitudinaliter plicatá, transversim lirata, liris planis, interstitiis tenuissimè longitudinaliter striatis; labio cum callo albo nitido tecto, anticè producto, libero; labro intus lirato, margine denticulato.*
Hab. —? Mus. Cuming.
19. *NASSA NIVEA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, candidá, nitidá; anfractibus planulatis plicis longitudinalibus distantibus, transversim sulcatá; labio cum callo mediocri tecto, margine acuto*

producto; labro margine subcrenulato, intus lirato; columellá anticè triplicatá.

Hab. Batangas, island of Luzon, 21 fathoms, coarse sand (*H. C.*).
Mus. Cuming.

20. *NASSA PLICATELLA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, fulvá; labro albido; anfractibus subrotundatis longitudinaliter plicatis transversim liratis, liris ad plicas nodulosis; labio cum callo mediocri; columellá anticè uniplicatá; labro margine acuto, intus lirato.*

Hab. Wallwich Bay, Africa. *Mus.* Cuming.

Subgenus *TRITONELLA*, Adams; *Tritonia*, Fleming.

Shell turrited, cancellated; aperture rounded, not produced into an anterior canal; outer lip not dentate, with a marginal varix.

1. *NASSA DECUSSATA*, Kiener.

Bucc. decussatum, Kien. Mon. Bucc. pl. 30. f. 3.

Hab. Brisbane Water, East Australia (*Mr. R. Strange*).

2. *NASSA TRITONIFORMIS*, Kien.

Bucc. tritoniformis, Kien. Mon. Bucc. pl. 30. f. 2.

Hab. Senegal.

3. *NASSA ASCANIAS*, Brug.

Bucc. ascanias, Brug. Dict. no. 42.—*B. asperulum*, Brocc.—*B. macula*, Montag.—*N. rudis*, Gualt.—*B. Lacepedii*, Payr.—*Tritonia varicosa*, Fleming.—*B. coccinella*, Lam.—*B. incrassatum*, Müll.—*B. minutum*, Penn.

Hab. Mediterranean.

4. *NASSA FASCIATA*, Lamk.

Bucc. fasciatum, Lam.; Gualtieri, pl. 43. fig. *m*; Kien. Mon. Bucc. pl. 22. f. 86.

Hab. New Holland.

5. *NASSA DENTIFERA*, Powis.

Nassa dentifera, Powis; Kien. Mon. Bucc. pl. f. .

Hab. South America.

6. *NASSA FESTIVA*, Powis.

Nassa festiva, Powis.

Hab. —?

7. *NASSA ANOMALA*, Reeve.

Triton anomalus, Hinds, Moll. Voy. Sulph. pl. 4. f. 13, 14.

Hab. Island of Quibo, Veragua.

8. *NASSA SCABRIUSCULA*, Powis.

Nassa scabriuscula, Powis.

Hab. —?

9. *NASSA MULTIGRANA*, Dunker.*Bucc. multigranum*, Dunker; Phil. Abild. t. 2. f. 13.*Hab.* — ?10. *NASSA SIGNATA*, Dunker.*Bucc. signatum*, Dunker; Phil. Abild. t. 2. f. 17.*Hab.* — ?11. *NASSA OBLIQUEPLICATA*, Dunker.*Bucc. obliqueplicatum*, Dunker; Phil. Abild. (Buccinum) t. 1. f. 13.*Hab.* — ?12. *NASSA FUSCATA*, A. Adams. *N. testá ovatá, spirá acuminatá, anfractibus convexiusculis, fuscá, longitudinaliter plicatá, transversim liratá, plicis ad liras tuberculatis, interstitiis transversim striatis; columellá rugosá; labro posticè sinuato, intus dentato-lirato.**Hab.* — ? Mus. Cuming.Subgenus *TRITIA*, Risso.

Shell turritid; inner lip spreading; outer lip not dentate, without a marginal varix.

1. *NASSA RETICULATA*, Linn.*Bucc. reticulatum*, Linn.; List. Conch. t. 966. f. 21 a; Kien. Mon. Bucc. pl. 23. f. 91 & pl. 19. f. 71.*Hab.* Mediterranean.2. *NASSA GAYII*, Kiener.*Bucc. Gayii*, Kien. Mon. Bucc. pl. 21. f. 79.*Hab.* St. Helena, sandy mud.3. *NASSA SULCATA*, Kien.*Bucc. sulcatum*, Kien. Mon. Bucc. pl. f. .*Hab.* — ?4. *NASSA CONCINNA*, Powis.*Nassa concinna*, Powis.*Hab.* Philippines.5. *NASSA TRIVITTATA*, Say.*Bucc. trivittatum*, Say.*Hab.* New York.6. *NASSA DEALBATA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, acuminatá, subturritá, albidá, fasciá pallidá luteá cinctá; anfractibus planulatis longitudinaliter plicatis, plicis nodulosis, transversim liris; columellá tuberculato-dentatá; labro extus incrassato, intus dentato-lirato.**Hab.* Dumaguete, isle of Negros, 11 fathoms, black coarse sand (H. C.). Mus. Cuming.

7. *NASSA COSTELLIFERA*, A. Adams. *N. testá ovato-conicá, acuminatá, albidá, fusco-variegatá, fasciá fuscá in ultimo anfractu longitudinaliter costulatá, transversim liratá; costellis nodulosis; anfractibus planiusculis; labio transversim corrugato-plicato; labro intus lirato.*

Hab. Curimas. Mus. Cuming.

8. *NASSA TRIFASCIATA*, A. Adams. *N. testá ovato-acuminatá; spirá acutá, productá, pallidè cærulescente aut albidá, fasciis tribus transversis rufis ornatá, longitudinaliter subplicatá, transversim sulcatá; columellá lævi, callo cum nitido expanso tecto; labro margine acuto, intus lirato.*

Hab. Vigo Bay (*M'Andrew*). Mus. Cuming.

Subgenus DESMOULEA, Gray.

Shell subglobose, covered with a downy epidermis; spire short; apex papillary.

1. *NASSA ABBREVIATA*, Wood.

Bucc. abbreviatum, Wood, Chem. Conch. pl. 153. f. 1463; Kien. Mon. Buccinum, pl. 26. f. 105.

Hab. Indian Ocean.

2. *NASSA RETUSA*, Lam.

Bucc. retusum, Lam., Chem. Conch. t. 153. f. 1465; Kien. pl. 24. f. 94.

Hab. —?

3. *DESMOULEA PINGUIS*, A. Adams. *D. testá ovatá, abbreviatá, ventricosá; spirá brevi, apice mucronato; anfractibus gibbosis, lutescente albo variegatá; epidermide fusco villosa tectá, transversim striatá; labio calloso; columellá lævi, anticè tuberculo unico, uniplicatá; labro intus lirato.*

Hab. Senegal. Mus. Cuming.

4. *DESMOULEA PYRAMIDALIS*, A. Adams. *D. testá ovato-conicá; spirá acuminatá, apice obtuso, violascente, longitudinaliter evanidè plicatá, transversim sulcatá; labio fusco subcalloso simplici; labro extus marginato, intus lirato.*

Hab. —? Mus. Cuming.

5. *DESMOULEA CRASSA*, A. Adams. *D. testá ovato-conicá, abbreviatá, solidá, lævi; spirá obtusá, apice violaceo; anfractibus supernè gibbosis, rufescente albo variegatá, transversim sulcatá; labio cum callo crasso tecto; columellá transversim liratá, anticè uniplicatá, tuberculis duobus instructá; labro intus lirato.*

Hab. Japan. Mus. Cuming.

6. *DESMOULEA JAPONICA*, A. Adams. *D. testá ovatá, lævi, nitidá, anticè transversim sulcatá, fulvescente, maculis lineisque transversis fuscis ornatá, albo variegatá; labio anticè calloso; columellá anticè tuberculis tribus instructá; labro extus incrasato, intus lirato.*

Hab. Japan (*Siebold*). Mus. Cuming.

Subgenus ACICULINA, A. Adams.

Shell turritid; inner lip with a circumscribed callus free anteriorly; outer lip with the margin thickened and flexuose.

1. ACICULINA COSTATA, A. Adams. *A. testá turritá, acuminatá, serotiná, nitidá, longitudinaliter costatá, transversim sulcatá; labio calloso, anticè fusco, producto; labri margine subrecto, intus lirato.*

Hab. —? Mus. Cuming.

2. ACICULINA STRIATA, A. Adams. *A. testá ovato-turritá, fuscá, fasciá pallidá transversá ornatá, anfractu penultimo gibboso ad suturas longitudinaliter plicatá, transversim valde striatá; labio calloso; labri margine vix incrassato, intus lirato.*

Hab. San Nicholas, isle of Zebu, 5 fathoms, sandy mud (H. C.). Mus. Cuming.

3. ACICULINA LABIATA, A. Adams. *A. testá turritá, acuminatá, nitidá, cinerescente, fasciá pallidá transversá ornatá, longitudinaliter costatá, costis ad suturam nodulosis, transversim sulcatá; labio fusco, calloso; labro margine incrassato, fusco, valde flexuoso, posticè sinuato, in medio producto.*

Hab. Malacca, coarse sand, 10 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.

4. ACICULINA GLABRATA, A. Adams. *A. testá turritá, acuminatá, lævi, nitidá, longitudinaliter substriatá, albidá, fasciis cinerescensibus maculisque fuscis ornatá; labio calloso, anticè uniplicato; labri margine incrassato, flexuoso, in medio producto.*

Hab. Philippines. Mus. Cuming.

5. ACICULINA MACULATA, A. Adams. *A. testá turritá, lævi, nitidá, albá, maculis luteo-fuscis longitudinalibus ornatá, transversim sulcatá, sulcis distantibus; labio calloso, anticè producto; columellá uniplicatá; labro extus marginato, intus lirato.*

Hab. Banang, Sargassinan, isle of Luzon, muddy sand, low water (H. C.). Mus. Cuming.

6. ACICULINA VITTATA, A. Adams. *A. testá turritá, albidá, nitidá, fasciá transversá fuscá interruptá ornatá, transversim sulcatá, longitudinaliter costatá; labio calloso; columellá bituberculatá, et anticè valde uniplicatá; labro extus varicoso, intus dentato-lirato.*

Hab. Ticao, coral sand, 6 fathoms (H. C.). Mus. Cuming.

2. ON A NEW SPECIES OF THE GENUS MONTIFRINGILLA.
BY JOHN GOULD, F.R.S.

For a knowledge of this species we are indebted to Lord Gifford, by whom several examples were killed in Thibet. It is intimately allied to *Montifringilla Gebleri*, but differs in being of a larger size,